

Orijinal Soru: Temel Bilimler 105

105. Anestezi uygulanması planlanan Parkinson hastalarında aşağıdakilerden hangisi kullanılmamalıdır?

- A) Difenhidramin
- B) Atraküryum
- C) Droperidol
- D) Propofol
- E) Atropin

Doğru Cevap: C

DERS NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

(Bu referanslar; soru kitabı Tüm Tıp Soruları, Kamp notlarımız ya da non spesifik slaytlardan DEĞİL, sadece güncel ders notlarımızdan verilmiştir. Bu notları şubelerimizde kolayca edinip, referansları kontrol edebilirsiniz.)

Temel Bilimler 105. soru Tusdata Farmakoloji Ders Notu 2. Fasikül Sayfa 314
Dopaminerjik D2 aktivite azalır → Parkinson hastalığı Dopaminerjik D2 aktivite artarsa → Huntington koreisi / Şizofreni

İLGİLİ NOTLAR

Notumuzda olan ve üstüne basa basa anlattığımız iki bilgiyi birleştirince soru çok kolay çözülüyor !!!

Referansımız yanlış olan tüm seçenekleri **tek tek eleyiyor!!!**

Temel Bilimler 105. soru Tusdata Farmakoloji Ders Notu 2. Fasikül Sayfa 571	
Antipsikotik ilaçlar ve türevleri (dopamin 2 reseptör antagonistleri)	Proklorperazin, klorpromazin, flufenazin, droperidol, haloperidol, perfenazin
Dopamin 2 reseptör antagonistleri	Domperidon, metoklopramid, trimetobenzamid

Antiemetik ilaçlar	
*5-HT-3 reseptör antagonistleri	Ondansetron, granisetron, tropisetron (uzun QT oluşturur), polanosetron, ramosetron
Antipsikotik ilaçlar ve türevleri (dopamin 2 reseptör antagonistleri)	Proklorperazin, klorpromazin, flufenazin, droperidol, haloperidol, perfenazin

Temel Bilimler 105. soru
Tusdata Farmakoloji Ders Notu 2.
Fasikül Sayfa 571