

Orijinal Soru: Klinik Bilimler 132

132.Yirmi sekiz yaşındaki kadın hastanın genel kontrol amaçlı yapılan tetkiklerinde ALT değeri normalin 1,5 katı saptanıyor. İki ay önceki laboratuvar testleri normal olan hastanın hikâyesinden ilaç, bitki veya alkol kullanımının olmadığı öğreniliyor. Vücut kitle indeksi normalin hafif üzerinde olan hastaya diyet ve egzersiz öneriliyor. On beş gün sonra tekrarlanan tetkiklerinde ALT ve AST değerleri normalin 3 katı saptanıyor, diğer laboratuvar testleri normal bulunuyor.

Aşağıdakilerden hangisi, hastada bundan sonraki aşamada istenecek ilk basamak tetkiklerden değildir?

- A) IgM Anti-HAV
- B) IgM Anti-HBc
- C) HBsAg
- D) AMA
- E) ANA, SMA

Doğru Cevap:D

DERS NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

(Bu referanslar; soru kitabı Tüm Tus Soruları, Kamp notlarımız ya da non spesifik slaytlardan DEĞİL, sadece güncel ders notlarımızdan verilmiştir. Bu notları şubelerimizde kolayca edininip, referansları kontrol edebilirsiniz.)

İLGİLİ NOTLAR

Soruyu ister şıklardan **tek tek eleyerek** yapın...

Klinik Bilimler 132. soru
Tusdata Dahiliye Ders Notu Fasikül 3 1. Fasikül Sayfa 193

- **Akut viral hepatit şüphesi olan bir hastada ilk istenecek serolojik testler şunlardır;**
 - ✓ Anti-HAV IgM
 - ✓ HBsAg
 - ✓ Anti-HBc IgM
 - ✓ Anti-HCV

☑ **Takip ve Tedavi:**

Klinik Bilimler 132. soru
Tusdata Dahiliye Ders Notu Fasikül 3 1. Fasikül Sayfa 211

Otoimmün Hepatit

- ☑ **Tanım**
 - Hastalık birçok yönü ile diğer otoimmün hastalıklara benzemektedir ve diğer otoimmün hastalıklarla birlikte görülebilir.
 - **Genç kadınlarda** sık görülür.
 - **Ekstrahepatik bulgularla** sevreten kronik karaciğer inflamasyonuna yol

Klinik Bilimler 132. soru
Tusdata Dahiliye Ders Notu Fasikül 3 1. Fasikül Sayfa 211

- ☑ **Laboratuvar ve Tanı**
 - Sıklıkla hafif-orta ALT ve AST yüksekliği ve poliklonal hipergamaglobulinemi (**IgG yüksekliği**) görülür.
 - **Tip 1 ve Tip 2** olmak üzere iki ana gruba ayrılır:
 - ✓ **En sık** tip 1 otoimmün hepatit görülür.
 - ✓ **Antinükleer antikor (ANA)** ve **anti-düz kas antikor (ASMA)** pozitifliği tip 1 otoimmün hepatit ile ilişkilidir
 - ✓ **Anti-LKM1 (liver kidney mikrozomal antikor)** ve **Anti-LC1 (liver**

212

TUS HA

Klinik Bilimler 132. soru
Tusdata Dahiliye Ders Notu Fasikül 3 1. Fasikül Sayfa 212

Primer Biliyer Kolanjitis (Siroz)

- ☑ **Tanım ve genel özellikleri:**
 - Orta ve küçük boy **intrahepatik** safra kanallarının progresif hasarı ile karakterize otoimmün bir hastalıktır.
 - Primer biliyer siroz/kolanjitis (PBK) asıl olarak **kadınları** (% 90) etkiler ve genellikle **orta yaşta** klinik bulgu verir.

☑ **Patoloji:**

Klinik Bilimler 132. soru
Tusdata Dahiliye Ders Notu Fasikül 3 1. Fasikül Sayfa 212

- ☑ **Tanı:**
 - Kolestaz enzimleri ve direkt bilirubin **artmıştır.**
 - **Bilirubin düzeyi** prognoz tayininde en önemli belirleyicidir.
 - **Serum Ig M düzeyleri** artmıştır.
 - **Antimitokondriyal antikorlar (AMA)** hastaların büyük çoğunluğunda pozitifdir.
 - Kolesterol düzeyleri artmıştır.

İsterseniz de **direkt** doğru cevabı işaretleyin...
Bizim notlarımız size soruyu her türlü çözdürür...
TUSDATA = KALİTE

Bu soru hakkında daha fazla referansımızı görmek için www.tusdata.com'u ziyaret ediniz.