

Orijinal Soru: Klinik Bilimler 133

133.Kolondan kaynaklanan akut alt gastrointestinal kanamanın en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Divertikülozis
- B) İskemik kolit
- C) İnflamatuvar bağırsak hastalıkları
- D) Rektal ülserler
- E) Kolon tümörleri

Doğru Cevap:A


KAMP NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

İLGİLİ NOTLAR

206

TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

TUSDATA®
TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



Klinik Bilimler 133. soru

Tusdata Genel Cerrahi Kamp Notu 1. Fasikül Sayfa 206


ALT GİS KANAMALARI

- En sık nedeni **divertiküler hastalıktır.**
- Kolon kaynaklı kanamaların en sık nedeni **divertiküler hastalıktır.**
- İnce bağırsak kökenli kanamaların en sık nedeni ise **anjiodisplazilerdir.**

Alt GİS kanamasının nedenleri

Kolondan kaynaklanan	%95	İnce bağırsaklardan kaynaklanan	%5
Divertiküler hastalık	%30-40	Anjiyodisplaziler	
Anorektal hastalıklar	%5-15	Erozyon ve ülserler (potasyum, NSAİİ)	
İskemi	%5-10	Crohn hastalığı	
Neoplazm	%5-10	Radyasyon	
Enfeksiyöz kolit	%3-8	Meckel divertikülü	
Post-polipektomi	%3-7	Neoplazm	
İnflamatuvar bağırsak hastalığı	%3-4	Aortoenterik fistül	
Anjiyodisplazi	%3		
Radyasyon koliti /proktiti	%1-3		
Diğer	%1-5		
Bilinmeyen	%10-25		





Klinik Bilimler 133. soru

Tusdata Genel Cerrahi Kamp Notu 1. Fasikül Sayfa 206

ALT GİS KANAMALARI

- En sık nedeni **divertiküler hastalıktır**.
- Kolon kaynaklı kanamaların en sık nedeni **divertiküler hastalıktır**.
- İnce bağırsak kökenli kanamaların en sık nedeni ise **anjiodisplazilerdir**.

Alt GİS kanamasının nedenleri

Kolondan kaynaklanan	%95	İnce bağırsaklardan kaynaklanan	%5
Divertiküler hastalık	%30-40	Anjiyodisplaziler	
Anorektal hastalıklar	%5-15	Erozyon ve ülserler (potasyum, NSAİİ)	
İskemi	%5-10	Crohn hastalığı	
Neoplazm	%5-10	Radyasyon	
Enfeksiyöz kolit	%3-8	Meckel divertikülü	
Post-polipektomi	%3-7	Neoplazm	
İnflamatuvar bağırsak hastalığı	%3-4	Aortoenterik fistül	
Anjiyodisplazi	%3		
Radyasyon koliti /proktiti	%1-3		
Diğer	%1-5		
Bilinmeyen	%10-25		

