

Orijinal Soru: Klinik Bilimler 136

136.Nefes darlığı nedeniyle başvuran hastanın fizik muayenesinde multinodüler guatr saptanıyor. Hastadaki guatrın boyundaki ana damarlara ve trakeaya bası yaptığı ve nefes darlığının buna bağlı olduğu düşünülüyor.
Hastada guatra bağlı basıyı ortaya koymak için aşağıdaki fizik muayene belirtilerinden hangisinin pozitif olması gerekir?

- A) Tilt belirtisi
- B) Adam-Stockes belirtisi
- C) Stellwag belirtisi
- D) Pemberton belirtisi
- E) Pendred belirtisi

Doğru Cevap:D

HIZLI TEKRAR NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR



GENEL CERRAHİ HIZLI TEKRAR

47

109.Aşağıdakilerden hangisi meme başı akıntısının bir hastada meme kanseri olma olasılığının artırıcı özelliklerinden biri **değildir**?

- A) Spontan olması
- B) Tek taraflı olması
- C) Birden çok kanaldan olması
- D) Yaşın 40 ve üzerinde olması
- E) Kitle ve birlikte olması

Doğru cevap: C

TİROİD HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ

55. ANATOMİSİ - TİROİD FONKSİYON TESTLERİ - ANOMALİLERİ

- Nervus laringeus inferior (N. rekürrens, RLS) sağda ve solda seyri... Solda ligamentum arteriosum altından, sağda subklavyan arterin altından dönerek larinke ulaşır.
- Tiroid innervasyonu...

Sinirler	Innervasyon	Yaralanması
Rekürren larineal sinir	Larinksin krikotiroid kas hariç tüm intrinsik kaslarını innerve eder	• Tek taraflı: Aynı taraftaki vokal kordun paralizine yol açar. Ses kısıklığı, kabaşma gözlenir • Bilateral: Rima glottis daralır. Ses kaybı olur. Acil trakeostomi gerekir.
Süperior larineal sinir'in eksternal dalı	Krikotiroid kası innerve eder. Vokal kordun gerilmesini sağlar	• Amelita Galli Curci siniri de denir. Tiz ve yüksek sesler çıkartılamaz.
Süperior larineal sinir'in internal dalı	Duyu siniridir. Supraglottik larinksin duyusunu taşır	• Aspirasyona yol açabilir.

- "Tiroid sinirleri" başlıklı şekile bakınız.
- Tiroid nodülleri bulunan ve klinik olarak ötiroid gibi görünen hastaların bir çoğunda gerekli olan tek tiroid fonksiyon testi... TSH
- Hipertiroidinin erken tanısında en yararlı test... Serbest T3
- Tiroglobülinin en önemli kullanım alanı... Diferansiye tiroid kanserlerinin nükslerinin saptanması. (TANIDA KULLANILMAZ)
- Diferansiye tiroid kanserlerinin tanınması / tedavisi... İyot-131
- Ultrasonografide malignite açısından şüpheli bulgular...

Ultrasonografide malignite yönünden şüpheli bulgular

- Mikrokalsifikasyon
- Hipoekojenite
- Düzensiz sınırlar veya halo yokluğu
- Solid nodül
- Nodül içi damarlanma
- Uzunluğunun genişliğinden fazla olması

- En sık tiroid anomalisi... Tiroglossal kanal kisti
- Tiroglossal kanal kisti cerrahisinin adı... Sistrunk ameliyatı
- Tiroglossal kanal kistinden gelişmeyen tiroid kanseri... Medüller kanser (En sık papiller tiroid kanseri görülür)

56. GUATR

- Guatr... Tiroid bezinin herhangi bir nedenle büyümesi
- Guatr'ın patofizyolojisi... Artan TSH (Yetersiz hormon sentezi ve diğer parakrin büyüme faktörlerine sonucunda)
- Endemik guatrın en önemli nedeni... İyot eksikliği
- Wolff-Chaikoff etkisi... Farmakolojik dozda iyotun tiroid hormon sentezini ve salımını inhibe etmesi
- Jod-Basedow sendromu... Ötiroid guatrı olan bir hastaya iyot verilmesi ile hastanın kontrolsüz tirotoksikozaya girmesi

Wolff-Chaikoff etki : İYİ
Jod-Basedow etki: KÖTÜ

Klinik Bilimler 136. soru
Tusdata Genel Cerrahi Hızlı Tekrar
Kampı 1. Fasikül Sayfa 047

- Pemberton bulgusu... Hasta kollarını yukarıya kaldırdığında substernal guatra bağlı olarak, bası bulgularının artması, yüzde kızarma, boyundaki venlerde genişleme
- Guatrı olan hastalarda en sık tiroid fonksiyon durumu... Ötiroidi
- Endemik guatrlarda, özellikle de nodül içermeyen diffüz guatrlarda, iyot ve tiroksin replasmanı ile bezin boyutlarında... Dramatik azalmalar görülebilir

Guatrdaki ameliyat endikasyonları

- Bası semptomları.
- Tiroksin süpresyonuna rağmen büyüme.
- Retrosternal uzanım.
- Malignite şüphesi.
- İİAB ile malignitenin gösterilmesi.
- Kozmetik sorunlar.

İLGİLİ NOTLAR