

Orijinal Soru: Klinik Bilimler 143


143.Herediter anjiyoödem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Otozomal dominant kalıtım gösterir.
- B) Ataklar sıklıkla ekstremiteler ve abdomende ortaya çıkar.
- C) Kadınlarda östrojen kullanımı ile tetiklenebilir.
- D) Tedavisinde antihistaminikler kullanılır.
- E) Lokal travma ile tetiklenebilir.

Doğru Cevap:D

DERS NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

(Bu referanslar; soru kitabı Tüm Tus Soruları, Kamp notlarımız ya da non spesifik slaytlardan DEĞİL, sadece güncel ders notlarımızdan verilmiştir. Bu notları şubelerimizde kolayca edinip, referansları kontrol edebilirsiniz.)



- Deri altı dokusunu, orofarenksi, larinks, gastrointestinal traktusu ve genital bölgeyi primer olarak ilgilendiren, tekrarlayan ödem epizodları ile karakterizedir. Hastalığın belirtileri ilk 10 yıl içinde çıkar.
- Klinikte tekrarlayıcı yüz ve ekstremiteler şişlikleri, akut, çevresi sınırlı ödem (72 saatte kendiliğinden geçer), bağırsak duvarı ödeme bağlı kolik tarzında tekrarlayıcı karın ağrısı, kusma, ishal, ses kısıklığı, stridor gibi belirtiler görülebilir. Kaşıntı ve kızarıklık genellikle yoktur.
- Amiloidoz, sinirsel sağırılık, bacak ağrısı, eritema marginatum olabilir.

Tanı

Klinik Bilimler 143. soru
Tusdata Pediatri Ders Notu 2. Fasikül Sayfa 669

Herediter anjiyoödem tedavisi

1- Uzun süreli tedavi:

- Uzun etkili Androjenler (danazol) C1 esteraz inhibitör sentezini arttırdığı için kullanılabilir.
- C1 inhibitör konsantrasi (3-4 günde bir)
- Epsilon aminokaproik asit semptomları azaltır.

2- Akut atak tedavisi:

- C1 inhibitör konsantrasi -ilk tercih tedavi
- Taze donmuş plazma: Bazı hastalarda ödem artabilir (TDP içindeki kinin substratlarına bağlı olarak), bu nedenle hayatı tehdit eden vakalarda dikkatli kullanılmalıdır.
- C1 inhibitör konsantrasi bulunamazsa Havayolu obstrüksiyonu olan ağır vakalarda rasemik veya IM epinefrin kullanılabilir.

Ecalantit: Kallikrein antagonisti.16 yaş üstünde akut atakta kullanılabilir.

İkatibant: Bradykinin tip-2 reseptör antagonisti. Tüm çocukluk çağı için kullanımı uygundur.

Antihistaminik veya steroid kullanılmaz!

İLGİLİ NOTLAR

Herediter anjiyoödem hem **tedavisini** anlatmışız, hem de soruda istenilen bilgiyi **sanki soracaklarını sezmişiz** gibi yazmışız: **antihistaminik verilmez!!!!!!**