

Orijinal Soru: Klinik Bilimler 143

143.Herediter anjiyoödem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Otozomal dominant kalıtım gösterir.
- B) Ataklar sıklıkla ekstremiteler ve abdomende ortaya çıkar.
- C) Kadınlarda östrojen kullanımı ile tetiklenebilir.
- D) Tedavisinde antihistaminikler kullanılır.
- E) Lokal travma ile tetiklenebilir.

Doğru Cevap:D

HIZLI TEKRAR NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR



PEDİATRİ HIZLI TEKRAR

63

SORULAR

Kronik ürtiker etiyolojisi	
İdiyopatik	Vakaların %60-70'i
İdiyopatik vakaların %35-40'ı IgG, anti-IgE ve anti-FcεRI (yüksek afinite IgE reseptör α zincir) otoantikorları taşır.	
Fiziksel (%30)	Dermografizm Kolinerjik ürtiker Soğuk ürtikeri Gecikmiş basınç ürtikeri Solar ürtiker Vibratuvar ürtiker Akuajenik ürtiker
Otoimmün	SLE JRA Graves Hashimoto Çölyak hastalığı İnflamatuar bağırsak hastalıkları Lökositoklastik vaskülit
Otoinflamatuvar/ periyodik ateş sendromları	NOMID (Neonatal onset multisistem otoinflamatuvar hastalık) Muckle-Wells sendromu FCAS (Ailevi soğuk otoinflamatuvar sendrom)
Neoplastik	Lenfoma Mastositoz Lösemi
Anjiyoödem	Herediter anjiyoödem (OD kalıtılan C1-esteraz inhibitör eksikliği) Edinsel anjiyoödem Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri

- Akut ürtikerde ürtiker plakları bir yerde en fazla ne kadar süreyle kalır... 24 saat
- Bir günden uzun süren, basmakla solmayan ürtikeryal plak... Ürtikeryal vaskülit
- Papüler ürtikerin en sık nedeni... Böcek ısırığı
- Kronik ürtikerin otoimmün olup olmadığını anlamaya yarayan test... Otolog serum inokülasyon testi
- Herediter anjiyoödem Tip 1 de temel patoloji... C1 esteraz inhibitörü eksik
- Herediter anjiyoödem Tip 2 de temel patoloji... C1 esteraz inhibitörü var ama yapısı bozuk
- Artan C1 esteraz ne yapar?... FXII aktivasyonu (Fibrinoliz artar, bradikinin artar), Kompleman klasik yoldan aktive olur
- Herediter anjiyoödemde klinik... Ödem; ekstremitelerde, yüzde, batında (karın ağrısı, kusma), solunum yollarında (solunum sıkıntısı)
- Herediter anjiyoödemde ödem atakları en fazla ne kadar süreyle kalır... 24 saat

Klinik Bilimler 143. soru
Tusdata Pediatri Hızlı Tekrar Kampı 1.
Fasikül Sayfa 063

- Herediter anjiyoödemde atak tedavisinde ne kullanılır?... C1 esteraz inhibitörü, Taze donmuş plazma, Ekallantid, İkatibant
- Atak tedavisinde kullanılan kallikrein antagonisti... Ekallantid
- Atak tedavisinde kullanılan bradikinin antagonisti... İkatibant
- Herediter anjiyoödemde profilaksisinde ne kullanılır?... C1 esteraz inhibitörü, Danazol, Epsilon aminokaproik asit

1. Beta blokör kullanmakta olan hastalarda anafilaksi tedavisinde epinefrine yanıt alınamayabilir. Bu durumda hastanın tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi tercih edilmelidir?

- A) Glukagon
- B) Antihistaminikler
- C) Glukokortikoidler
- D) ACTH
- E) Dopamin

Doğru cevap: A

2. Penisilin enjeksiyonu sonrası anafilaksi geçirme şüphesi ile acil müdahale edilen hasta olaydan 2 saat sonra görülüyor. Anafilaksi tanısı için aşağıdakilerden hangisine bakmak yararlıdır?

- A) Serum histamin düzeyi
- B) Serum triptaz düzeyi
- C) Serum IL4 düzeyi
- D) Serum IL5 düzeyi
- E) Serum bradikinin düzeyi

Doğru cevap: B

3. Oniki yaşında ve tekrarlayan streptokok farenjiti hikayesi olan çocuk yine boğaz ağrısı şikayeti ile getiriliyor. Hızlı streptokok test sonucu pozitif bulunarak ilk dozu ofiste verilmek üzere oral amoksisillin başlanıyor. Bir saat sonra ağız çevresinde garip bir his ve karıncalanma hissediyor göz kapaklarında dudakta şişlik ve vücutta kaşıntılı kırmızı plaklar oluşuyor. Arkasından yutma güçlüğü ve ses kalınlığı geliyor. Nabız: 130/dakika, solunum sayısı: 32/dakika, kan basıncı: 70/30 mmHg, ateş: 37,2°C olarak saptanıyor.

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Amoksisiline bağlı ürtiker
- B) Amoksisiline bağlı ürtiker ve anjiyoödem
- C) Amoksisiline bağlı anafilaksi
- D) Amoksisiline bağlı anafilaktoid reaksiyon
- E) Herediter anjiyoödem

Doğru cevap: C

4. Kronik idiyopatik ürtiker ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Sistemik hastalık bulguları sıktır
- B) Fiziksel ürtiker tipidir
- C) Antitiroid antikor varlığı daha sıktır
- D) Otolog deri testi negatiftir
- E) Laringeal ödem sık rastlanan bir bulgudur

Doğru cevap: C

5. Aşağıdakilerden hangisi, kronik ürtiker kriteridir?

- A) İki hafta süreyle haftada en az üç atak
- B) Üç hafta süreyle haftada en az iki atak
- C) Dört hafta süreyle haftada en az üç atak
- D) Beş hafta süreyle haftada en az iki atak
- E) Altı hafta süreyle haftada en az iki atak

Doğru cevap: E

İLGİLİ NOTLAR

Pediatri hızlı kampımızda da açıkça tedaviyi tamamen anlatmışız, en ince ayrıntısına kadar