

# Orijinal Soru: Klinik Bilimler 146

146.Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Hastalığa neden olan mutasyonlardan birisi olan PKD1 gen mutasyonu 4. kromozomda yer alır.
- B) Sıklıkla çocukluk yaşlarında belirti verir.
- C) Kistler oluşuktan sonra birkaç yıl içerisinde son dönem böbrek hastalığına ilerler.
- D) En sık görülen böbrek dışı bulgusu intrakraniyal anevrizmadır.
- E) Hastalığı seyirinde böbrek boyutları artar.

Doğru Cevap:E

## HIZLI TEKRAR NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

## İLGİLİ NOTLAR

68

TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



268.

- I. Tübüllerde yaygın tutulum
- II. Tübüllerde atlamasız tutulum
- III. Tübüloreksis (bazal membranda parçalanma)

Yukarıdaki bulgulardan hangisi veya hangileri iskemik akut tübüler nekrozda beklenmez?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Doğru cevap: B

269.Malign hipertansiyonun böbrekteki karakteristik bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kresentik glomerülonefrit
- B) Hiyalen arteriyoskleroz
- C) Hiperplastik arteriyoskleroz
- D) Mönckeberg'in kalsifik medial sklerozu
- E) Wire loop (tel halka) görünümü

Doğru cevap: C

### 68. BÖBREĞİN KİSTİK HASTALIKLARI

- Böbrekte en sık görülen, edinilmiş böbrek kisti hangisidir... Basit kist
- Kistlerin içinde immatür mezenkim ve kıkırdak

Klinik Bilimler 146. soru  
Tusdata Patoloji Hızlı Tekrar Kampı 1.  
Fasikül Sayfa 068

- OD (Otozomal Dominant) polikistik böbrek hastalığına en fazla eşlik eden ekstrarenal bulgu hangisidir... Konjenital karaciğer kistleri
- OD (Otozomal Dominant) polikistik böbrek hastalığının genetik özelliği nedir... PKD-1 geninde (polisistini kodlar) mutasyon
- OD Polikistik böbrek hastalığına eşlik edebilen diğer bulgular nelerdir ...
  - Berry anevrizması
  - Kolon divertikülleri, over kistleri, aort anevrizması, mitral kapak prolapsusu
- OR (Otozomal Resesif) polikistik böbrek hastalığına en fazla eşlik eden ekstrarenal bulgu hangisidir... Konjenital hepatik fibrozis
- OR polikistik böbrek hastalığı hangi mutasyon sonucunda ortaya çıkar... Fibrosistini kodlayan PKHD geni
- Juvenil Nefronofitizis (üremik medüller kistik hastalık)...
  - OR geçişli nefronosistin mutasyonu
  - Atrofi yüzünden böbrek küçülür (böbreği küçülten kistik hastalık)
- Çocuklarda ve genç erişkinlerde son evre böbrek hastalığının en sık genetik sebebi hangisidir... Nefronofitizis
- Medüller sünger böbrekte en önemli klinik bulgular hangileridir... Renal kalsifikasyon ve hematuri (genetik geçmez, böbrek yetmezliğine neden olmaz)
- Renal adenom ve renal hücreli karsinoma neden olabilen, hematüriye neden olacak kadar kanayabilen böbreğin edinsel kistik hastalığı hangisidir... Diyalize bağlı kistik hastalık

## SORULAR

270.Intrauterin eksitus olmuş bir fetusun otopsisinde, böbreklerden birinin büyümüş olduğu, değişik boyutlarda kistler içerdiği ve irregüler görünümde olduğu saptanıyor. Ayrıca üreteral agenezi görülüyor. Mikroskopik incelemede bu böbrekte, basık epitelle döşeli kistik yapılar ve normal nefronların yanı sıra indiferansiye mezenkim adaları, immatür toplayıcı duktuslar ve matür kıkırdak dokusu izleniyor.

Bu olguda en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nefronofitizis
- B) Medüller sünger böbrek
- C) Multikistik renal displazi
- D) Otozomal dominant tip polikistik hastalık
- E) Otozomal resesif tip polikistik hastalık

Doğru cevap: C

271.Fibrosistin mutasyonu sonucunda gelişen kistik böbrek hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kistik renal displazi
- B) Otozomal resesif polikistik böbrek hastalığı
- C) Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı
- D) Juvenil nefronofitizis
- E) Medüller sünger böbrek

Doğru cevap: B

272.Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı, aşağıdaki genlerden hangisinin mutasyonu sonucu oluşur?

- A) PDS1
- B) PDS2

Klinik Bilimler 146. soru  
Tusdata Patoloji Hızlı Tekrar Kampı 1.  
Fasikül Sayfa 068

273.Aşağıdaki kistik böbrek hastalıklarının hangisinde, böbreğin boyutları normalden küçüktür?

- A) Otozomal resesif polikistik böbrek hastalığı
- B) Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı
- C) Medüller sünger böbrek
- D) Üremik medüller kistik hastalık
- E) Basit kist

Doğru cevap: D

274.Aşağıda verilen "kistik hastalık – ilişkili klinik tablo" çiftlerinden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

- A) Otozomal resesif polikistik böbrek hastalığı – Pulmoner hipoplazi
- B) Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı – Berry anevrizmaları
- C) Medüller sünger böbrek – Nefrokalsinozis
- D) Juvenil nefronofitizis – Aort anevrizması
- E) Diyaliz ilişkili kistik hastalık – RCC gelişme riski

Doğru cevap: D

### 69. BÖBREK TAŞLARI VE HİDRONEFROZ

- En sık görülen böbrek taşları hangileridir... Kalsiyum oksalat taşları
- İdrar yolu enfeksiyonları nedeniyle görülen böbrek taşları hangileridir... Magnezyum amonyum fosfat taşları (strüvit taşları)