

# Orijinal Soru: Klinik Bilimler 185

185.Yedi yaşındaki kız hasta, çocuk acil servisine 3 defa bol miktarda taze kırmızı kan içeren kusma şikâyeti ile getiriliyor. Hikâyesinden prematüre doğduğu ve sarılık nedeniyle göbek kateterinden kan değişimi yapıldığı öğreniliyor. Fizik muayenesinde 4 cm orta sertlikte dalak ele geliyor.

**Bu hastada kanlı kusmanın en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) İnvajinasyon
- B) Özofageal varis
- C) İnflamatuvar bağırsak hastalığı
- D) Meckel divertikülü
- E) Hemanjiyom

**Doğru Cevap:**B

## HIZLI TEKRAR NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR



PEDİATRİ HIZLI TEKRAR

45

- Çocuklarda en sık karaciğer nakli endikasyonu... Eks trahepatik biliyer atrezi.
- Alagille sendromu...
  - Özel yüz görünümü (Üçgen yüz, küçük çene).
  - Kalp-damar anomalileri (Periferik ve valvüler Pulmoner stenoz en sık).
  - Vertebra anomalileri (Kelebek vertebra).
  - Renal anomaliler.
- Alagille sendromunda KC biyopsisinde tanı... 10 portal alandan en az 6'sında, safra yolunun olmaması ile korur.
- Byler hastalığı (PFIC)...
  - Yüksek serum direk bilirubinine rağmen GGT ve kolesterolün normal olması.
  - 3. aylarda şiddetli kaşıntı ve sarılık
  - Nedensiz burun kanamaları
  - İshal ve Fankoni tipi tübülöpato
  - Renal anomaliler.
  - 3-6 yaşlarda ölüm
- Byler hastalığının kesin tedavisi... Karaciğer transplantasyonu.
- Caroli hastalığı... İntrahepatik safra kanallarında kistik dilatasyon vardır. Akut ataklar dışında transaminazlar normaldir. Malignensi riski yüksektir.
- Neonatal kolestazın en sık herediter geçişli nedeni... Alfa-1 antitripsin eksikliği.
- Alfa-1 antitripsin eksikliğinde tek küratif tedavi... Karaciğer transplantasyonu.

### SORULAR

1. Gelişimi normal olan 12 yaşında bir kız çocuk kişilik değişikliği, yazısında bozulma ve tremor nedeniyle getiriliyor. Fizik muayenede tremor dışında patolojik bir bulgu saptanmıyor.

Oftalmolojik incelemede Kayser-Fleischer halkası saptanan bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Friedreich ataksisi
- B) Sydenham koresi
- C) Wilson hastalığı
- D) Ataksi-telanjektazi
- E) Akut dissemine ensefalomyelit

**Doğru cevap:** C

2. Çocuklarda karaciğer transplantasyonu en sık aşağıdaki hastalıkların hangisinde yapılır?

- A) Konjenital hepatik fibrozis
- B) Kistik Fibrozis
- C) Otoimmün hepatit
- D) Biliyer atrezi
- E) Wilson hastalığı

**Doğru cevap:** D

3. Reye sendromu aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili değildir?

- A) Salisilat alımı
- B) Karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme
- C) Hiperglisemi
- D) Viral enfeksiyon
- E) Letarji

**Doğru cevap:** C

4. Uzun süredir sarılık, şiddetli kaşıntı ve büyüme geriliği olan 1 yaşındaki bir erkek hastanın fizik muayenesinde karaciğer 4 cm olarak palpe ediliyor. Yapılan laboratuvar testlerinde; trombosit sayısı 256.000/mm<sup>3</sup>, direk bilirubin: 8 mg/dl, indirek bilirubin: 4 mg/dl, ALT, AST, ALP ve trigliserit yüksek, GGT ve kolesterol normal bulunuyor. Öyküden hastanın sık ve nedensiz burun kanaması şikâyeti ile de sık sık kulak-burun-boğaz polikliniğine götürüldüğü öğreniliyor.

**Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Caroli hastalığı
- B) Gilbert sendromu
- C) Kronik hepatit B
- D) Alagille sendromu
- E) Byler hastalığı

**Doğru cevap:** E

### 21. GİS KANAMALARI

Klinik Bilimler 185. soru  
Tusdata Pediatri Hızlı Tekrar Kampı  
(2020) 1. Fasikül Sayfa 045

- 1 yaşından sonra çocuklarda en sık masif üst GİS kanaması nedeni... Özofagus varisleridir.
- Çocuklarda alt GİS kanamasının en sık nedeni... Anal fissürdür.
- Çocuklarda (Özellikle >2 yaş) ağrısız alt GİS kanamasının en sık nedeni... Juvenil (Retansiyon) Poliplerdir.
- Çocukluk çağında en sık masif alt GİS kanaması nedeni... Meckel divertikülüdür.

### 22. ABDOMİNAL KİTLELER

- Çocuklarda karındaki kitlelerin en sık nedeni... Organomegalidir. İlk sırada enfeksiyona bağlı hepatomegali, ikinci sırada splenomegali vardır.
- Çocuklarda travmalardan en çok etkilenen organ... Dalaktır.
- Masif splenomegalinin çocuklarda en sık nedeni... Kalaazar.
- Dalığı en çok büyüyen hemolitik hastalık... Herediter sferositoz
- Spontan dalak rüptürünün en sık görüldüğü hastalık... Enfeksiyöz mononükleoz
- Yenidoğanda karındaki kitlelerin çoğu... Böbrek kökenlidir. En sık rastlanan üreter tıkanması ve polikistik böbrektir.
- Doğumda en sık palpe edilen benign kitle... Üreteropelvik bileşke tıkanıklığına bağlı oluşan hidronefrozdur. İkinci sıklıkla polikistik böbrek gelir.
- Çocuklarda teratom en sık... Sakrokoksigal bölgededir ve 3 ay içinde koksiks ile birlikte çıkarılmalıdır.
- Çocuklarda en sık görülen GİS polip tipi... Juvenil poliplerdir (Retansiyon polipi, inflamatuvar polip) ve en sık erkeklerde görülürler.
- Çocuklarda kolorektal poliplerin en sık görüleni... Hiperplastik olanlardır.
- Çocuklarda adenomatöz polipler en sık... Rektum ve kolondadır. Kanseri riski % 100'dür.

## İLGİLİ NOTLAR