

Orijinal Soru: Klinik Bilimler 192

192.Tourette sendromu ile birlikte görülme olasılığı en az olan bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
- B) Yeme bozuklukları
- C) Obsesif kompulsif bozukluk
- D) Depresif bozukluklar
- E) Otizm spektrum bozukluğu

Doğru Cevap:B

DERS NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

(Bu referanslar; soru kitabı Tüm Tus Soruları, Kamp notlarımız ya da non spesifik slaytlardan DEĞİL, sadece güncel ders notlarımızdan verilmiştir. Bu notları şubelerimizde kolayca edinip, referansları kontrol edebilirsiniz.)

Klinik Bilimler 192. soru
Tusdata Pediatri Ders Notu 1. Fasikül Sayfa 363

Gilles de la Tourette Sendromu (TS)

- Başlangıcı 2 ve 21 yaşları arasında olabilir ve yaşam boyu sürer. Bir çok olguda OD geçiş söz konusudur.
- Vücudun değişik kısımlarında (Aralarından en az birinin **vokal tik** olduğu) çok sayıda motor tikleri olan, bu tiklerin başlangıcının 21 yaşından önce olduğu, 1 yıldan daha uzun süre (artıp azalsa da devam eden) vakalarda TS tanısı konur.
- **Obsesif-kompulsif davranış ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (ADHD) da sık bulunur.**
- Motor tikler yüz, göz kapağı, boyun ve omuzlarda görülen çok sayıda değişken hareketi içerir. Eninde sonunda bu **tiklere** boğaz temizleme, burun çekme, havlama, **koprolali** (Açık saçık sözler), **ekolali** (Hastaya yöneltilen kelimeleri tekrarlama), **palilali** (Kendi kelimelerini tekrarlama) ve **ekokinezis** (Başkalarının hareketlerini taklit etme) gibi vokal tikler eklenecektir.

İLGİLİ NOTLAR

Pediyatri ve küçük stajlar notlarımız sayesinde yanlış seçenekler **kolaylıkla** elenebilmektedir.

364 Klinik Bilimler 192. soru
Tusdata Pediatri Ders Notu 1. Fasikül Sayfa 364

- Her ne kadar konservatif yaklaşım ve biyogeribildirim programları bazı hastalarda faydalı olsa da, motor tiklerin veya vokalizasyonun çocuğun sosyal yaşantısını veya okul başarısını etkilediği durumlarda **ilaç tedavisi** başlanmalıdır.
- Metilfenidat TS nedeni değildir ancak maskelenmesine neden olabilir.
- ADHD olan ve uyarıcı ilaçlarla tedavi gören çocuklar tik gelişimi açısından yakından izlenmelidir.
- **Haloperidol**, TS'li çocukların yaklaşık %50'sinde etkili olmaktadır. **Penfluridol**, **pimozid** ve **klonidin** faydalı olabilecek diğer ilaçlardır.
- TS hastalarının yaklaşık %50'sinde obsesif-kompulsif semptomlar da görülür.
- Hastaların yaklaşık %60'ında trisiklik antidepresan olan **klomipramin** etkili olmaktadır. Diğer faydalı antidepresan ilaçlar **sertralin**, **fluoksetin** ve **fluvoksamindir**.

Klinik Bilimler 192. soru
Tusdata Küçük Stajlar Ders Notu 1. Fasikül Sayfa 053

Tikler

Gilles de la Tourette sendromu:

- ✓ Tourette sendromu istemsiz hareket ve sözel yanıtlarla karakterize tik hastalığıdır.
- ✓ En belirgin ilk belirtiler göz kırpması, yüz buruşturma şeklinde yüzde görülen tiklerdir.
- ✓ Erkeklerde daha sıktır.
- ✓ Obsesif kompulsif bozukluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile birlikteliği sıktır.
- ✓ Ancak depresyon, anksiyete bozuklukları, dürtü bozuklukları ile de birliktelik gösterebilir.
- ✓ DSM 5'e göre tanı için gerekli bulgular;

Bu soru hakkında daha fazla referansımızı görmek için www.tusdata.com'u ziyaret ediniz.