

Orijinal Soru: Klinik Bilimler 195

195.Keloid oluşumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Yara boyutları ile sınırlıdır.
- B) Kontraktür gelişimi siktir.
- C) Tüm ırklarda aynı sıklıkta görülür.
- D) Sıklıkla spontan olarak geriler.
- E) Genetik yatkınlık gösterir.

Doğru Cevap:E

KAMP NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

İLGİLİ NOTLAR

52

TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



FETAL YARA İYİLEŞMESİ

- En önemli özelliği **skar oluşmamasıdır**. Fetal yarada **TGF beta bulunmaz**. **İnflamasyon** daha **azdır**. Fetal yaralarda **hyaluronik asit** erişkin yaralarından daha fazladır.

KRONİK YARALAR

- **Üç ay içerisinde iyileşmeyen yaralardır**.Alta yatan patolojiler: Basınç, diyabet, venöz staz...

Klinik Bilimler 195. soru
Tusdata Genel Cerrahi Kamp Notu 1. Fasikül Sayfa 052

AŞIRI İYİLEŞME

- **Hipertrofik skar** deri seviyesinden kabank ve orijinal yara sınırları içindedir.**Keloid** deriden kabanktır, ancak orijinal yara sınırlarını aşar.
- **Hipertrofik skar genellikle travmadan 4 hafta sonra gelişir** ve genellikle basınç bölgelerinde ve fleksör yüzlerde yerleşir. Eritemli, kabank lezyonlar şeklindedir; **genellikle kendiliğinden geriler**. **Epitelizasyon süresi 21 günü geçtiği zaman** hipertrofik skar riski artar.
- **Keloid yaranmadan 3 ay - yıllar sonra gelişebilir**. Küçük yaralar büyük lezyonlara neden olabilir; nadiren geriler.
- **TGF ekspresyonu hipertrofik skarda daha fazladır**.
- Fibroblastlar, **epitel hücreleri ve endotel hücrelerine karşı antinükleer antikor sentezi keloidde görülürken** hipertrofik skarda görülmez.
- Cerrahi eksizyon, **intralezyonel kortikosteroid enjeksiyonu**, topikal silikon tabakalar, radyasyon ya da basınç uygulaması gibi yöntemlerle kombine edildiğinde rekürrens azalır.

Keloid ve hipertrofik skarın özellikleri

	Keloid	Hipertrofik skar
İnsidans	Seyrek	Sık
Etnik gruplar	Afrikalı, Asyalı, İspanyol	İrk eğilimi yoktur
Önceki yaranma	Evet	Evet
Vücutta tercih ettiği yerler	Boyun, göğüs, kulak memesi, omuzlar, üst sırt	Herhangi bir yer
Genetik	Otozomal dominant, tam olmayan penetrasyon	yok
Zamanlama	Başlangıçta semptomu yok, yaranmadan yıllar sonra gelişebilir	Yaranmadan 4-6 hafta sonra
Semptomlar	Ağrı, kaşıntı, hassasiyet, orijinal yara sınırlarını aşma	Kabank, kaşıntı, yara sınırları içinde gelişir
Regresyon	Yok	Sıklıkla kendiliğinden geriler
Kontraktür	Seyrek	Sık
Histoloji	Hiposellüler, kalın, rastgele yönde dalgalı kollajen lifler	Paralel yönde kollajen lifler