

Orijinal Soru: Klinik Bilimler 199

199.Yanık tedavisinin erken dönemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Hastalar öncelikle soğutulmalıdır.
- B) Tüm hastalara sistemik profilaktik antibiyotik başlanmalıdır.
- C) Tüm kimyasal yanıklarda cilt su ile yıkanmalıdır.
- D) İntravenöz sıvı tedavisi için yanık ekstremitedeki venler de kullanılabilir.
- E) Tüm hastalara immünizasyon durumlarına bakılmaksızın tetanoz aşısı yapılmalıdır.

Doğru Cevap:D

KAMP NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

İLGİLİ NOTLAR

Klinik Bilimler 199. soru
Tusdata Genel Cerrahi Kamp Notu 1. Fasikül Sayfa 067

9

YANIK

- Yanık en ciddi travmadır.

YANIKLI HASTANIN İLK DEĞERLENDİRMESİ

HAVA YOLU YÖNETİMİ

- İlk ve en önemli adım hava yolunun açık tutulmasıdır. İnhalasyon hasarı düşündüren bulgular ağız çevresi ve burun kıllarında yanık olması, kabalaşmış ses, wheezing, stridor veya hasta tarafından tanımlanan solunum sıkıntısıdır.
- Solunum yetmezliği gelişme olasılığı yüksektir. Entübasyon gerekir. İlk muayene ile eş zamanlı olarak kalın lümenli periferik intravenöz kateter takılarak, sıvı resüsitasyonuna başlanır.
- Yanık hastalarında profilaktik antibiyotik asla kullanılmaz.
- Tetanoz profilaksisi acil odasında yapılmalıdır. Ağrı yönetimi yapılır. Akut anksiyete tedavisinde temel unsur benzodiazepinlerdir.
- %30'dan fazla yanık alanı olan hastalar majör yanıktır ve stres ülseri (curling ülseri) profilaksisi verilmelidir.

YANIK DERİNLİĞİ

- Yanık ilk 48-72 saat dinamik bir olaydır. İlk gün yüzeysel gibi görülen bir yanık üçüncü gün derin yanık haline gelebilir.

BİRİNCİ DERECE YANIKLAR (YÜZEYEL)

- Sadece epidermistedir. Geriye döner. Hiperemi vardır. Güneş yanıkları bu tip yanıklardır.

İKİNCİ DERECE YANIKLAR (KISMI KALINLIKTA)

- Epidermis ve kısmen dermis yanıklardır.

YÜZEYEL İKİNCİ DERECE DERMAL YANIKLAR

- Epidermis ve dermisin üst tabakalarında görülür.
- Epidermis dermis arasında içi plazma ve A vitamininden zengin sıvı ile dolu büller vardır.
- Büller hemen yanık sonrası görülebileceği gibi 12-24 saat sonra da gelişebilir.
- 1-2 haftada reepitelize olur (enfeksiyon gelişmezse)

DERİN İKİNCİ DERECE DERMAL YANIKLAR

- Retiküler dermise kadar ilerleyen yanıklardır. Daha soluk ve benekli görünümündedir. Basmakla solmaz. Büller gelişir. 2-5 haftada reepitelize olur.

ÜÇÜNCÜ DERECE YANIKLAR (TAM KAT YANIKLAR)

- Cilt tam kat yanmıştır. Ağrısızdır. Bu yanıklarda klasik olarak eskar gelişir. Deri greftleri gerekir.