

Orijinal Soru: Klinik Bilimler 200

200. Karaciğer transplantasyonu endikasyonu olan hastalıklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Tüm yaş grupları arasında en sık neden hepatit B'ye bağlı kronik karaciğer hastalığıdır.
- B) Alkole bağlı kronik karaciğer hastalığında iki aylık alkol bırakma süresi transplantasyon yapılabilmesi için yeterlidir.
- C) Transplantasyon gerektiren akut karaciğer yetmezliği nedenleri ülkelere göre belirgin farklar gösterir.
- D) Primer sklerozan kolanjit hastalarının %10'unda kronik karaciğer hastalığına ülseratif kolit de eşlik eder.
- E) Nonalkolik steatohepatit özellikle Sahra altı Afrika'da sık görülen bir karaciğer transplantasyonu endikasyonudur.

Doğru Cevap: C

KAMP NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR



TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

127

KOMPLİKASYONLARI

- İdrar çıkışında azalma ile kendini gösterir.
- **Kanama** → Akut başlangıçlı yan ağrısı, insizyon bölgesinde kitle
- **Renal ven trombozu** → Ani hematuri + idrar çıkışında azalma görülür. Genellikle graft kurtarılamaz. Nefrektomi yapılır.
- **Renal arter trombozu** → İdrar çıkışında ani düşme, transplantasyon sonrasında B2 - mikroglobulin düzeyinin düşmemesi görülür. Genellikle graft kurtarılamaz. Nefrektomi yapılır.
- **Ürolojik komplikasyonlar** → Üreter kaçağı, üreter obstruksiyonu, üreter stenozu. **Erken stenozun** nedeni lenfösel basısı veya iskemi ve **geç multipl stenozların** nedeni polyoma (BK virüsü) virüsüdür.
- **Uzun Dönem Komplikasyonları** → Böbrek transplantasyonu sonrası en sık 3 ölüm nedeni enfeksiyon, kanser ve kardiyovasküler hastalıktır. Erken dönemde en sık ölüm nedeni enfeksiyonlar görülür. Uzun vadede en sık ölüm nedeni kardiyovasküler hastalıktır.
- **Enfeksiyon** → Böbrek transplantasyonu sonrası görülen enfeksiyonlar daha çok fırsatçı enfeksiyonlardır. Herpetik enfeksiyonlar, CMV enfeksiyonları, EBV enfeksiyonları görülebilir.
- **Kardiyovasküler hastalık** → Böbrek transplantasyonu sonrası iskemik kalp

Klinik Bilimler 200. soru
Tusdata Genel Cerrahi Kamp Notu 1. Fasikül Sayfa 127

KARACİĞER TRANSPLANTASYONU

- **Erişkinlerde** en sık endikasyon viral hepatitlerdir. **Çocuklarda** en sık endikasyon ekstrahepatik bilier atrezidir.
- **Kronik hepatit C virüsü** enfeksiyonu günümüzde Batı'da en sık karaciğer transplantasyonu endikasyonudur.

Karaciğer Transplantasyonunun Sık Karşılaşılan Endikasyonları

Yetişkin	Çocuk
<ul style="list-style-type: none">• Viral hepatit, A/B/C, non A/B/C akut, kronik• Alkolik siroz• Primer bilier siroz• Sekonder bilier siroz• Sekonder kolanjit• α-1 antitripsin eksikliği• Hemakromatozis• Budd-Chiari sendromu, Akut hepatit B	<ul style="list-style-type: none">• Bilier atrezi• Kronik aktif hepatit• Hepatoma• Neonatal hepatit• Hepatik fibrozis• Sekonder bilier siroz

KOMPLİKASYONLAR

- Rejeksiyonu en iyi gösterecek yöntem perkütan karaciğer biyopsisidir.
- **Primer Non Fonksiyon** → Belirlenebilir bir neden olmaksızın graftın fonksiyon göstermemesidir. Tek çözüm retransplantasyondur. AST tepe değerlerinin 5000'leri bulması primer non fonksiyon için prediktiftir.
- **Biliyer obstruksiyon** → biyopside safra yolu proliferasyonu ve perikolanjit ile kendini gösterir; fakat tanı kolanjiyografi ile konur. Dilatasyon veya stent ile tedavisi yapılır.

İLGİLİ NOTLAR