

# Orijinal Soru: Klinik Bilimler 209

209.Lateral yerleşimli anal fissür varlığında, aşağıdakilerden hangisinin altta yatan hastalık olma olasılığı en azdır?

- A) HIV/AIDS
- B) Diabetes mellitus
- C) Tüberküloz
- D) Lösemi
- E) Sifiliz

Doğru Cevap:B

## HIZLI TEKRAR NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR



GENEL CERRAHİ HIZLI TEKRAR

93

Eksternal hemoroid tedavisi	
Tromboze	<72 saat içinde ise: Trombektomi >72 saatten sonra ise: Diyet, ağrı kesiciler ve oturma banyosu
Non-tromboze	Diyet düzenlenmesi

Hemoroidlerde klinik	
Defekasyonu takiben görülen ağrısız ve parlak kırmızı renkte kanama	İnternal hemoroidal hastalık (1,2 ve 3. derece)
Ağrılı hemoroidler	4. derece internal ve tromboze eksternal hemoroidler

- Hemoroidektominin en sık komplikasyonu... Üriner retansiyon

Klinik Bilimler 209. soru  
Tusdata Genel Cerrahi Hızlı Tekrar  
Kampı 1. Fasikül Sayfa 093

Klinik Bilimler 209. soru	
Saat 6 ve 12 hizası dışındaki fissürler atipik lokalizasyonlu fissürlerdir.	Öncelikle akla gelecek hastalık Crohn'dur.
Atipik yerleşimli fissür görülebilen hastalıklar... Crohn hastalığı, epidermoid Ca, tüberküloz, sifilis, lösemik infiltrasyon, HIV	
Defekasyonu takiben görülen ağrılı ve parlak kırmızı renkte kanama... Anal Fissür	

Kronik anal fissürlerin bileşenleri	
Hipertrofiye anal polip	
Sentinel skin tag (deri çıkıntısı)	
Ülser (fissür)	

- Anal fissür tanısı... Fizik muayene
- Anal fissür ameliyatı... Lateral internal sfinkterotomi (İnternal sfinkter otonom sinir sistemi tarafından innerve edilir; istemsiz kasılır. Sfinkterotomi ile anal spazm engellenir)

Eksternal sfinkter kesilir ise inkontinans olur, Bu nedenle eksternal sfinktere dokunma!!!	
Anorektal apselerden sık görülen tipi... Perianal apse	
Anorektal apselerin en sık belirtisi... Ciddi anal ağrı	

Anorektal apselerin tedavisi	
Cilt insizyonu ile drene edilenler	Perianal apseler İskiorektal apseler İskiorektal apselerin yukarı yayılımı sonucu gelişen supralevator apseler
İnternal sfinkterotomi ile drene edilenler	İntersfinkterik apseler
Rektumdan drene edilenler	İntersfinkterik apselerin yukarı yayılımı sonucu gelişen supralevator apseler

- Perianal fistülün en sık nedeni... Anorektal apseler
- En sık görülen perianal fistül... İntersfinkterik fistül

Perianal fistüllerin tedavisi	
Basit fistüllerde: Fistülotomi	
Fistül traktının tamamen çıkartılması: Fistülektomi	
Ekstrasfinkterik, suprasfinkterik ve iç ağız yüksek transsfinkterik fistüller: Seton	

## 106. ANOREKTAL BÖLGE MALİGN HASTALIKLARI

- Kondiloma akuminata... Anogenital siğil (HPV 6 ve 11 ile ilişkiler benign, HPV 16 ve 18 ile ilişkiler malign)
- Anal intraepitelyal neoplazi... Bowen hastalığı. Anüsün skuamöz karsinoma in situs
- Anüsün epidermoid karsinomları... Skuamöz hücreli karsinom, kloajenik karsinom, transizyonel karsinom ve bazoloid karsinom
- Anal kanalda gelişen malign tümörler içinde daha sık görülen... Skuamöz hücreli karsinom

Anal kanal yerleşimli epidermoid tümörlerin tedavisi	
Kası (sfinkter) tutmuyor ise lokal eksizyon	
Kası tutuyor ise kombine kemoradyoterapi	
Nüks ise abdominoperineal rezeksiyon (APR)	

- Verrüköz karsinom... Buschke-Lowenstein tümörü, dev kondiloma akuminata, kondiloma akuminatanın lokal agresif bir formu

HPV ile ilişkili anal kanal tümörleri	
Skuamöz hücreli karsinom, Bowen hastalığı	
Kondiloma akuminata	
Dev kondilom, Verrüköz kanser veya Buschke-Lowenstein tümörü	

- Anüsün Paget hastalığı... Perianal bölgedeki apokrin bezlerden kaynaklanan adenokarsinoma in situ

Bowen hastalığı: İn situ SCC Anüsün Paget hastalığı: İn situ adenokarsinom	
Deri ve gözden sonra melanomun en sık görüldüğü üçüncü yer... Rektum	
Melanomun GIS'te en sık yerleştiği yer... Rektum	

## SORULAR

229.Aşağıdakilerden hangisi fekal inkontinans nedenlerinden biri değildir?

- A) Anorektal cerrahi girişimler
- B) Pudental sinir yaralanması
- C) Pelvis kırıkları
- D) Psödomebranöz enterokolit
- E) Doğum eylemi sırasında travma

Doğru cevap: D

## İLGİLİ NOTLAR