

Orijinal Soru: Klinik Bilimler 210

210.İnguinal bölge ve hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Hesselbach üçgenini inguinal ligaman, rektus kılıfının lateral kenarı ve inferior epigastrik damarlar oluşturur.
- B) Femoral halkayı inguinal ligaman, Cooper ligamanı, lakunar ligaman ve femoral arter oluşturur.
- C) Hesselbach üçgeni içinde gelişen fitiklar indirekt fitiklardır.
- D) İnguinal kanalın arka duvarını (tabanını) eksternal oblik aponevrozu oluşturur.
- E) Kasık fitiklarının sınıflandırılmasında Poupart sınıflandırması kullanılır.

Doğru Cevap:A


KAMP NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

İLGİLİ NOTLAR

250

TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

TUSDATA
TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ




İnguinal anatomi

Klinik Bilimler 210. soru


Tusdata Genel Cerrahi Kamp Notu 1. Fasikül Sayfa 250

kenarı oluşturur.




Hesselbach üçgeni

- **Femoral kanal** Sınırları önde iliopubik trakt, posteriorde Cooper ligamanı (pektineal ligaman), lateralde femoral ven ve medialde lakunar ligamanı oluşturur.



Femoral kanal


HESSELBACH ÜÇGENİ (TRIGONUM INGUINALE)



Hesselbach üçgeni (trigonum inguinale) **direkt inguinal fitıkların** geliştiği yerdir.

Üçgenin sınırları

- **Alta;** lig. inguinale
- **Dışta;** a.v. epigastrica inferior
- **İçte;** m. rectus abdominis'in dış kenarı (linea semilunaris)




DİREKT İNGUİNAL HERNİ

Hesselbach üçgeni'nden (fossa inguinalis medialis) girer ve anulus inguinalis superficialis'den çıkar.

Fitik kesesinin içten dışa doğru katmanları;

1. Peritoneum parietale
2. Fascia transversalis



İNDİREKT İNGUİNAL HERNİ

Anulus inguinalis profundus'dan yani a.v. epigastrica inferior'un lateralinden (fossa inguinalis lateralis) girer, kanaldan geçer, anulus inguinalis superficialis'den çıkıp, funiculus spermaticus içinde scrotum'a iner.