

# Orijinal Soru: Klinik Bilimler 211


211.Aşağıdakilerden hangisi portal hipertansiyonda gelişen portosistemik koilateral yollardan biri değildir?

- A) Paraumbikal venler
- B) Koroner ven
- C) Sappey venleri
- D) Riolan arkı
- E) Retzius venleri

Doğru Cevap:D

## DERS NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

(Bu referanslar; soru kitabı Tüm Tus Soruları, Kamp notalarımız ya da non spesifik slaytlardan DEĞİL, sadece güncel ders notalarımızdan verilmiştir. Bu notları şubelerimizde kolayca edinip, referansları kontrol edebilirsiniz.)



## İLGİLİ NOTLAR

Referansımız yanlış şıkları eletmekle kalmıyor, doğru seçenekin de nokta atış gösteriyor.

**Hepatopedal Kollateraller:**

- ✓ Prehepatik obstrüksiyon varlığında devreye girip karaciğere sınırlı miktarda portal ven kani taşırlar.
- ✓ Sappey'in aksesuar venleri, derin sistik ven, epiploik venler, hepatokolik, hepatorenal venler hepatopedal venlerdir.
- ✓ **Porto-portal Anastomozlar** → V. portae'nin dallarındaki veya kökündeki tikanıklık bu anastomozlarla aşılmasına çalışılır. Bu anastomozların üçü önemlidir.
- ✓ **Dalak veninin arka gastrik ve sol gastrik ven yoluyla** vena porta ile bağlantısı
- ✓ **Gastroepiploik ven yoluyla** olan splenik – superior mezenterik anastomoz (Barkow arkı)
- ✓ Pankreas venleri ile olan **splenik-inferior mezenterik ven anastomozları**

**Hepatofugal Kollateraller:**

- ✓ Portal hipertansiyon varlığında kollaterallerin **karaciğerden kaval sisteme** doğru sıklıkla sağladığı akımdır. **Bu dolaşımda kan karaciğeri geçmekte zorlanır.**
- ✓ **Portokaval anastomozlar** olarak da bilinirler.

**Özofagus çevresi anastomozlar:**

- **Koroner ven** → Özofageal venler → Azigos, Hemiazigos venler → Vena kava inferior
- Özofagus varis kanamaları bu anastomozlardan kaynaklanır.

**Hemoroidal Anastomozlar:**

- **Superior hemoroidal ven** → Orta ve Inferior hemoroidal venler → Vena kava inferior

**Karin duvarı anastomozları:**

- **Umbilikal ve paraumbilikal venler** → Yüzeyel abdominal venler → Superior ve Inferior epigastrik venler → Kaval sistem
- Periumbilikal venlerin genişlemesi karında **"Medusa başı"** görünümüne yol açar.
- **Curveilhier-Baumgarten sendromunda** karaciğer atrofisi veya agenezisi vardır. Bunun nedeni umbilikal venin doğumdan sonra açık kalması ve porto- sistemik sirkülasyon oluşması nedeniyle karaciğere gelen kan akımının az olmasıdır.
- Klinikte umbilikal ven genişlemesi görülür. Dinlemekle thrill alınır.

**Retroperitoneal anastomozlar:**

- Vena cava inferiorta boşalan lomber venlerle superior mezenterik vene boşalan retroperitoneal venler arasındaki anastomozlardır. **Retzius venleri** de denir.

Referansımız yanlış  
şıkları eletmekle  
kalmıyor, doğru seçeneği  
de nokta atış gösteriyor.