

# Orijinal Soru: Klinik Bilimler 215

215. Elli yaşındaki kadın hasta; epigastriumda ani başlayan, sırta ve tüm kadranlara yayılan karın ağrısı nedeni ile acil servise başvuruyor. Fizik muayenesinde karın üst ve orta kadranlarında hassasiyet tespit ediliyor. Laboratuvar tetkiklerinde serum amilaz ve lipaz değerleri yüksek saptanıyor.

Bu hastada tanı ve diğer abdominal hastalıkların ekarte edilmesi için tercih edilmesi gereken en uygun radyolojik görüntüleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ayakta direkt karın grafisi
- B) Abdominal ultrasonografi
- C) Abdominal manyetik rezonans görüntüleme
- D) Kontrastlı abdominal bilgisayarlı tomografi
- E) Posteroanterior akciğer grafisi

Doğru Cevap: D

## DERS NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

(Bu referanslar; soru kitabı Tüm Tus Soruları, Kamp notlarımız ya da non spesifik slaytlardan DEĞİL, sadece güncel ders notlarımızdan verilmiştir. Bu notları şubelerimizde kolayca edinip, referansları kontrol edebilirsiniz.)

(%97) ve spesifite (%100) sahiptir

Klinik Bilimler 215. soru  
Tusdata Genel Cerrahi Ders Notu 2. Fasikül Sayfa 703

### KLİNİK BULGULAR

#### Ağrı

- ✓ En sık rastlanan bulgu epigastrik ağrıdır. Ağrı şiddetli ve sürekli, sıklıkla sırta vurur ve kuşak şeklinde olabilir.
- ✓ Sıklıkla ağır bir yemeği veya alkol alımını takiben ortaya çıkar, bulantı ve sürekli kusma eşlik eder.
- ✓ Ağrının şiddeti pankreatitin şiddeti ile orantılıdır.

Araç

## İLGİLİ NOTLAR

Hem klinik bulguları anlattık hem laboratuvar bulgularını verdik...

Altın standart radyolojik tetkikin adını dahi söyledik...

Size sadece cevabı işaretlemek kaldı...

Klinik Bilimler 215. soru  
Tusdata Genel Cerrahi Ders Notu 2. Fasikül Sayfa 704

### Enzimler / Amilaz

- ✓ Karın ağrısı olmadan amilaz yüksekliği bir anlam ifade etmez. Kan amilazı akut kolesistit, ülser perforasyonu ve intestinal obstrüksiyonda da yükselir.
- ✓ Pankreatitlerde genelde yükselir.
- ✓ Hastalık başlayınca yükselir ve 3-5 gün yüksek kalır.
- ✓ Amilaz yüksekliği ile pankreatitin şiddeti arasında bir ilişki yoktur. Hatta pankreatitin hafif bir formu yüksek amilaz düzeyleriyle birlikte olabilir.
- ✓ Hiperlipidemiye bağlı akut pankreatitte lipidler ve amilaz arasında interferans nedeniyle serum amilaz seviyesi genelde normaldir. Bir haftadan fazla devam eden amilaz yüksekliği devam eden inflamasyonu ya da psödokist, apse veya pankreatik asit gibi bir komplikasyon geliştiğini düşündürür.
- ✓ Pankreatik lipaz, tripsin ve elastaz düzeyleri yüksek bulunabilir.
- ✓ Pankreatik ekzokrin enzimlerden tanı için en yüksek özgüllük (spesifite) lipaz için saptanmıştır.

### BT

ansı saptanabilir. nöbetçi ans. bekli ans (sentinel loop).

Klinik Bilimler 215. soru  
Tusdata Genel Cerrahi Ders Notu 2. Fasikül Sayfa 704

### BT

- ✓ Akut pankreatit tanısını koyabilmek için en güvenilir ve öncelikli görüntüleme yöntemidir.
- ✓ Akut pankreatit tanısı konup 2-3 günde düzelmeyen tüm hastalara komplikasyon araştırmak için mutlaka çekilir.
- ✓ BT'de pankreas normal, ödemli olabilir, flegmon, peripankreatik sıvı koleksiyonu, nekroz, apse ve inflamasyonun yayılımı görüntülenebilir.
- ✓ Nekroz varlığı şiddetli pankreatiti gösterir.
- ✓ Kontrastlı yapılırsa pankreasın perfüzyon ve nekrozunu daha iyi belirler.
- ✓ Nekroz, sıvı koleksiyonu, psödokist tanısında da altın standart tomografidir.
- ✓ Hava kabarcığı görülmesi enfeksiyon varlığını destekler (enfekte pankreatik nekroz, pankreatik apse gibi).

1102

Bu soru hakkında daha fazla referansımızı görmek için [www.tusdata.com](http://www.tusdata.com)'u ziyaret ediniz.