

# Orijinal Soru: Klinik Bilimler 221

221.Light kriterlerine göre, aşağıdakilerden hangisi plevral sıvının eksuda niteliğinde olduğuna karar vermek için kullanılır?

- A) HDL
- B) LDH
- C) ALT
- D) GGT
- E) ALP

Doğru Cevap:B

## HIZLI TEKRAR NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

## İLGİLİ NOTLAR

58

TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



- Otuz yaşında erkek, nefes darlığı, öksürük şikayetleri var. 2 gün ampisilin-sulbaktam kullanımı ile şikayetleri değişmemiş. Balgam yaymasında bol lökosit, laboratuvarında SGOT, SGPT, BUN, kreatinin artmış, sodyum azalmış bulunuyor. Mental değişiklikleri var. En olası tanı... Legionella pneumoniae
- Ağır pnömoni nedeniyle yoğun bakıma yatırılan yaşlı erkek hastanın akciğer grafisinde bilateral ve yama tarzında, infiltrasyonlar var. Hastadan bronkoskopiyle alınan örneğin incelemesinde bol miktarda parçali lökosit, çok az sayıda bakteri hücresi görülüyor. İdrarda spesifik bir antijene yönelik test pozitif bulunuyor. En olası tanı... Legionella pneumoniae. Tanısı idrarda antijen bakılarak koyulur.
- Atipik pnömoni ve kulakta bülöz mirinjit birlikte olduğunda düşünülmesi gereken pnömoni tipi... Mikoplazma pnömonisi.
- Primer akciğer absesinin en sık nedeni... Anaeroblar
- Skonder akciğer absesinin en sık nedeni... Pseudomonas

### 52. MANTARLARLA OLUŞAN SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI

- Astım, santral bronşektazi, akciğerde aspergillus enfeksiyonu... Allerjik bronkopulmoner aspergillozis
- Allerjik bronkopulmoner aspergilloz tanılı hastada enfeksiyon için verecek ilaç... İtrakonazol
- İnvaziv aspergillozis için risk altında bulunan hastalar... Lösemi hastaları, kemik iliği transplantasyonu yapılmış hastalar
- İnvaziv aspergillozisten şüphelenildiğinde... Acil toraks tomografisi
- İnvaziv aspergilloziste toraks tomografisinde karakteristik bulgu... Halo belirtisi
- İnvaziv aspergillozis için tedavide ilk tercih... Varikanazol

### SORULAR

18. Aşağıdakilerden hangisinde aktif tüberküloz riski diğerlerine göre daha yüksektir?
- A) Malnüriyon
  - B) Diyabet
  - C) Böbrek yetmezliği
  - D) İmmünsüpresif tedavi
  - E) Posttransplantasyon dönemi

Doğru cevap: E

19. Tüberküloza yönelik balgam ARB boyaması pozitif olan hastalarda tanıyı hızlı bir şekilde doğrulamak ve ilaç direncini tespit etmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
- A) Quantiferon kan testi
  - B) Tüberkülin deri testi (PPD)
  - C) Akciğer grafisi
  - D) Bronkoalveolar lavaj
  - E) Nükleik asit amplifikasyon testi(PCR)

Doğru cevap: E

20. Antitüberküloz tedavi alan bir hastada gelişen hepatotoksisteden aşağıdaki ilaçlardan hangisinin sorumlu olma olasılığı en azdır?
- A) Rifampisin
  - B) İsoniazid
  - C) Etambutol
  - D) Pirazinamid
  - E) Rifabutin

Doğru cevap: C

### 53. PLEVRA HASTALIKLARI

- Transuda vasfında plevral effüzyonun en sık nedeni... Kalp yetmezliği
- Eksuda vasfında plevral effüzyonun en sık nedeni... Bakteriye enfeksiyonlar... Yaşlılarda en sık nedeni...

Klinik Bilimler 221. soru  
Tusdata Dahiliye Hızlı Tekrar Kampı  
1. Fasikül Sayfa 058

#### Transuda ve eksuda kriterleri ve görüldüğü hastalıklar

Özellik	Eksuda	Transuda
Protein (plevral)	> 3 g/dl	< 3 g/dl
Protein (plevra/serum)	> 0.5	< 0.5
LDH (plevra)	> 200 IU/L	< 200 IU/L
LDH (plevra/serum)	> 0.6	< 0.6

Özellik	Eksuda	Transuda
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pulmoner enfeksiyon (en sık)</li><li>• Maligniteler</li><li>• Pulmoner emboli</li><li>• GIS kaynaklı</li><li>• Kollajen vasküler hastalıklar</li><li>• Asbest maruziyeti</li><li>• By pass cerrahisi sonrası</li><li>• İlaçlar</li><li>• Sarkoidozis</li><li>• Hemotoraks, şilotoraks</li><li>• Ovarian hiperstimülasyon sendromu</li><li>• Meigs sendromu</li><li>• San tırnak sendromu</li><li>• Üremi</li><li>• Perikardiyal hastalıklar</li><li>• İyatrojenik yaralanma</li><li>• Radyoterapi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konjestif kalp yetmezliği (en sık)</li><li>• Nefrotik sendrom</li><li>• Periton diyalizi</li><li>• Üriner traktüs obstrüksiyonu</li><li>• Vena kava süp obstrüksiyonu</li><li>• Üriner toraks</li><li>• Miksödem</li></ul>

- Akut pankreatit ve özefagus hasarına bağlı gelişen plevral effüzyonda yüksek olan... Amilaz
- Düşük glukoz düzeyinin karakteristik olduğu plevral effüzyon nedeni... Romatoid artrit, Tbc, parapnömonik, maligniteler
- Tüberküloza bağlı plevral effüzyonda yüksek olan... ADA (adenozin deaminaz)
- Plevral effüzyonun infeksiyöz ajanlarla kontamine olması... Ampiyem
- Spontan primer pnömotoraksın en sık nedeni... (Distal asiner amfizem (Paraseptal amfizem)
- Göğüs ağrısı ve nefes darlığı olan hastada perküsyonda sağ hemitorasta skapula altından bazale kadar matite alınan ve oskültasyonda aynı bölgede solunum sesleri alınamayan bir hasta için en olası tanı... Plevral effüzyon