

Orijinal Soru: Klinik Bilimler 226

226. Erkeklerde penis tunica albuginea'sında oluşan travma sonrasında anormal yara iyileşmesi ve fibrotik plaklara bağlı gelişen ve genellikle penil deformiteyle karakterize olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bowen hastalığı
- B) Balanit
- C) Sklerodema
- D) Penis kanseri
- E) Peyronie hastalığı

Doğru Cevap: E

HIZLI TEKRAR NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

İLGİLİ NOTLAR

98

TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



- Sıklıkla periferik inflamatuvar artropatiye ek olarak sakroiliyak eklemin tutulması
- RF in bulunmaması (seronegatif)
- HLAB27 ile beraberliği.
- Lyme hastalığının etkeni nedir... Borrelia burgdorferi
- Lyme artritinin özelliği nedir... Kronik artrit ve ensefalit
- Gutta eklem aralığında ne birikir... Monosodyum urat kristalleri
- Gutta tanı koydurucu mikroskopik bulgu nedir... Tofüs
- Akut gut artrit en sık hangi eklemden görülür... 1. metatarsofalangeal eklem
- Gutta en sık hangi eklem tutulur... 1. metatarsofalangeal eklem
- Psödogutta en sık hangi eklem tutulur... Diz
- Psödogutta eklemden ne birikir... Kalsiyum pirofosfat dihidrat kristalleri
- Kırıkta kalsifikasyon (kondrokalsinozis) hangi hastalıkta görülür... Psödogut
- Nöropatik artropati (Charcot eklemi) yapan nedenler nelerdir...
 - DM (Diabetes Mellitus)
 - Sifiliz
 - Lepra
 - Siringomiyeli
 - Amiloid
 - Alkolik nöropati

SORULAR

424. Osteoartriti en iyi tanımlayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sinovyalde başlayan kronik iltihabi reaksiyondur
- B) Kalsiyum pirofosfat kristallerinden oluşan granülatöz lezyondur
- C) Eklem kırıkta olduğu oluşturan dejeneratif lezyondur
- D) Kazeifikasyon nekrozundan zengin granülatöz lezyondur
- E) Nötrofilde sengin pürülen iltihaptir.

Doğru cevap: C

425. Osteoartritte gözlenen en karakteristik histolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pannus gelişimi
- B) Diffüz proliferatif sinovit
- C) Fibröz veya kemiksi ankiloz
- D) Eklem sıvısında anizotropik kristaller
- E) Eklem kırıkta olduğu fibrilasyon ve yarıklanma

Doğru cevap: E

426. Kırk dört yaşında bir kadın hastada el eklemlerinde bilateral yerleşen akut ağrılı hastalıkta, eklem sıvısında yoğun, lenfosit ve plazma hücresi infiltrasyonu, ödem ve fibrin birikimi gözleniyor. Serumda RF pozitifliği saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Psöriatik artrit
- B) Gut artrit
- C) Romatoid artrit
- D) Reiter artrit
- E) Tüberküloz artrit

Doğru cevap: C

427. Aşağıdaki seronegatif spondilartropatilerden hangisinde sıklıkla eklem, üreter ve göz bulgularının bir arada görülme olasılığı en yüksektir?

- A) Ankilozan spondilit
- B) Psöriatik artrit
- C) Reiter sendromu
- D) Enteropatik artrit
- E) Still hastalığı

Doğru cevap: C

428. Aşağıdakilerden hangisi, seronegatif spondilartropati grubunda yer alan hastalıklardan biri değildir?

- A) Enterit ilişkili artrit
- B) Ankilozan spondilartropati
- C) Reiter sendromu
- D) Romatoid artrit
- E) Psöriatik artrit

Doğru cevap: D

106. YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ VE TÜMÖR BENZERİ LEZYONLAR

Yumuşak Doku Tümörleri Genetik

- Ewing Sarkom: t(11;22)/t(21;22)
- İskelet dışı miksoid kondrosarkom: t(9;22)
- Desmoplastik küçük mavi yuvarlak hücreli tümör: t(11;22)
- Şeffaf hücreli sarkom: t(12;22)
- Liposarkom (miksoid ve yuvarlak hücreli tipler): t(12;16)
- Sinovyal sarkom: t(X;18)
- Rabdomiyosarkom (Alveoler tip): t(1;13)/t(2;13)
- Dermatofibrosarkom protuberans: t(17;22)
- Alveoler soft part sarkom: t(X;17)
- İnfantil fibrosarkom: t(12;15)
- Nodüler fasiitis: t(17;22)
- Translokasyon varlığı için sitogenetik inceleme yapılmalıdır.

- Erişkinde en sık görülen yumuşak doku tümörü hangisidir... Lipom, en sık cilt altına yerleşir
- Liposarkom en sık nereye yerleşir... Proksimal ekstremite ve retroperitonun derin yumuşak dokusu
- Liposarkom (miksoid ve yuvarlak hücreli tipler) hangi genetik mutasyon içerir... t(12;16) ve MDM2 onkogeni
- En sık görülen psödosarkomatöz proliferasyon hangisidir... Nodüler fasiitis

Klinik Bilimler 226. soru
Tusdata Patoloji Hızlı Tekrar Kampı 1.
Fasikül Sayfa 098

- Yüzeysel fibromatozlar nelerdir... Dupuytren kontraktürü, Peyronie hastalığı

• Derin yerleşimli fibromatoz (Desmoid tümör) hangi sendroma eşlik edebilir... İntraabdominal tipler Gardner sendromuna eşlik eder.

• Paraneoplastik olarak hipoglisemi yapabilen yumuşak doku sarkomu hangisidir... Fibrosarkom

• Malign işi hücrelerin balık sırtı tarzında dizilmeleri hangi tümörde görülür... Fibrosarkom

• Çocukluk çağı ve adolesan dönemin en sık görülen yumuşak doku sarkomu hangisidir... Rabdomiyosarkom

• Rabdomiyosarkomun özellikleri nelerdir...

- En sık başboyun ve genitouriner sistemde görülür
- En sık subtipi embriyonel rabdomiyosarkomdur
- Rabdomiyoblast hücrelerden oluşmuştur
- Desmin, miyogenin ile pozitif boyanır
- t(1;13)/t(2;13)
- En iyi prognoza sahip rabdomiyosarkom tipi Botryoid tip

• Çocukta en sık görülen yumuşak doku tümörü hangisidir... Hemanjiyom

• Sinovyal sarkomun özellikleri nelerdir...

- Bifazik (epitelyal-mezenşimal) ya da monofazik olabilen yumuşak doku sarkomudur
- t(X;18)

• Undiferansiye Pleomorfik Sarkom...

- Ekstremitelerin derin yumuşak dokusundan (özellikle uyluk-kalça) çıkar
- Erişkin sarkomlarının en büyük kategorisini oluşturur.