

Orijinal Soru: Klinik Bilimler 229

229.Yirmi sekiz yaşında, G3P2, erken dönem ultrasonografi verileri ve son âdet tarihine göre 41 hafta 4 güne ulaşmış gebenin hâlâ sancıları başlamamış olduğundan aile ile konuşularak doğum indüksiyonu kararı alınıyor. Ultrasonografik incelemede plasenta fundal yerleşimli ve fetus baş prezentasyonunda olarak izleniyor; tahmini fetal ağırlık 3.300 gram ölçülüyor. Pelvik muayenede, pelvis doğuma uygun, servikal açıklık 4 cm, serviks santralize, kıvamı yumuşak, silinme yok ve baş seviyesi -2 şeklinde değerlendiriliyor.

Bu gebenin Bishop skoru kaçtır?

- A) 6
- B) 5
- C) 4
- D) 3
- E) 2

Doğru Cevap:A

KAMP NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

İLGİLİ NOTLAR

162

TUS HAZIRLIK M

Klinik Bilimler 229. soru
Tusdata Kadın Hast ve Doğum Kamp Notu 1. Fasikül Sayfa 162

Bishop skorlama sistemi				
Puan	0	1	2	3
Servikal dilatasyon (cm)	0	1-2	3-4	≥ 5
Servikal silinme (%)	0-30	40-50	60-70	≥ 80
Seviye	-3	-2	-1	+1, +2
Serviksin kıvamı	Sert	Orta	Yumuşak	-
Serviksin pozisyonu	Arka	Orta	Ön	-

- **Bishop skoru 9** ve üzerinde ise indüksiyonda başarılı olma olasılığı yüksektir. **Skorun 4'ün altında** olduğu durumlarda ise indüksiyona başlanamaz. Bu olgularda indüksiyon öncesi servikal olgunlaştırma yöntemleri uygulanmalıdır.

Servikal Olgunlaşma ve İndüksiyon Yöntemleri

Farmakolojik Yöntemler

- **Prostaglandin E₂ (Dinoproston) (N-93)**
- **Prostaglandin E₁ (Misoprostol)**
- **Oksitosin:** Oksitosinin yarılanma ömrü **3-5 dakika** olup, iv infüzyon ile kullanılır. Oksitosinin aminoasit yapısı arginin vasopressine benzer. Bu nedenle belirgin bir **antidiüretik etkisi** bulunur. Yüksek dozlarda kullanıldığında (20 mU/dk) suyun renal klirensi azalır ve **su entoksikasyonu** ve buna bağlı konvülsiyonlar hatta ölüm dahi olabilir. Nadiren dilüe edilmeden iv kullanılırsa **hipotansiyon, miyokardiyal iskemi** ve **göğüs ağrısına** yol açmaktadır.

Mekanik Yöntemler

- **Transservikal Kateter**
- **Higroskopik Dilatörler;** Doğal (**laminaria**) ya da sentetik (polivinil alkol polimer, hidrojel)
- **Amniotomi:** Membranların artifisiel olarak yırtılmasını takiben endojen prostaglandinlerde artış olmakta ve bu da doğumu indüklemektedir.

OPERATİF DOĞUMLAR

Epizyotomi

- Epizyotomi perineye uygulanan insizyonu olup aslında ikinci derece perine laserasyonudur. Rutin kullanılmamalıdır.
- Endikasyonları arasında **omuz distosisi, makat doğum, makrozomik fetus, oksiput posterior doğum, forceps** ve **vakum uygulaması, perineal uzunluğun çok kısa olması** bulunur.
- **Mediolateral** veya **median** olarak uygulanır.