

Orijinal Soru: Temel Bilimler 3

3. Solunum sıkıntısı şikâyetiyle başvuran bir hastanın toraks görüntülemesinde bifurcatio tracheae'nin alt komşuluğundaki lenf nodülleri tarafından bası altında olduğu izleniyor.

Bu hastada izlenen nodüller aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nodi lymphoidei bronchopulmonales
B) Nodi lymphoidei intrapulmonales
C) Nodi lymphoidei paratracheales
D) Nodi lymphoidei intercostales
E) Nodi lymphoidei tracheobronchiales

Doğru Cevap:E

HIZLI TEKRAR NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

İLGİLİ NOTLAR



ANATOMİ HIZLI TEKRAR

61

Trakeotomi ve trakeostomi... Trakeotomi; trakea'da yapılan insizyondur. Trakeostomi ise, trakea'da ağız oluşturmaz. Trakeostomi; orta hatta, tiroid kıkırdağın alt kenarından incisura jugularis'e uzanan vertikal (veya daha çok tercih edilen, krikoid kıkırdağın 2 cm aşağısından transvers) bir deri kesisinden sonra, 2. ve 3. trakea halkarından trakeostomi tüpünün konulma işlemidir. Bu girişimlerde; yetişkinlerde tiroid bezinin istmus'u, arcus venosus jugularis, v. thyroidea inferior ve varsa a. thyroidea ima'nın, çocuklarda ise v. brachiocephalica sinistra ile timus bezinin yaralanma riski vardır.

- Her iki akciğerde alt lobu diğer loblardan ayıran yarık... Fissura obliqua
- Sağ akciğerde orta lobu üst lobdan ayıran yarık... Fissura horizontalis
- Bronchiolus terminalis'ten sonra gelen hava yolu... Bronchiolus respiratorius
- Ğaz değişimi gerçekleşen yerler... Bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris ve alveoli pulmonis (Bu dört yapıya akciğer asinüsü denilir)

25. AKCİĞERLER

- Incisura cardiaca, hangi akciğer lobuna ait... Sol akciğer, lobus superior
- Lingula pulmonis, hangi akciğer lobuna ait... Sol akciğer, lobus superior
- Bronchus lingularis superior ve inferior hangi lobar bronkus'a ait... Bronchus lobaris superior sinister'e ait segmental bronkuslardır.
- Her iki akciğerde de bulunan bronchus cardiacus, hangi segmental bronkusun adı... Bronchus segmentalis basalis medialis
- Her iki akciğerde izi olan organ... Oesophagus ve kalp (trachea her iki akciğerle komşudur, fakat izi yoktur).
- Akciğer apekslerinin arka yüzlerinin komşuluğu... Gang. cervicothoracicum (stellat ganglion) ile komşudur (Pancoast sendromu, Horner sendromu)

Sağ akciğerin mediastinal yüz komşuları	Sol akciğerin mediastinal yüz komşuları
<ul style="list-style-type: none">V. cava superiorV. azygos (hilum pulmonis'in yukarısında izi var)V. cava inferiorV. brachiocephalica dextra	<ul style="list-style-type: none">A. subclavia sinistraArcus aortae (hilum pulmonis'in yukarısında izi var)Aorta thoracicaV. brachiocephalica sinistra

"Akciğerlerin mediastinal yüz komşulukları" başlıklı şekile bakınız.

- Linea axillaris mediana'da akciğer alt kenarı kaçınıcı kaburgayı keser... 8. kaburga
- Radix pulmonis'te bulunan yapıların önden... arkaya dizilimi... V. pulmonalis superior, A. pulmonalis, Bronchus principalis (VAB).
- Sağ radix pulmonis'te en üstte olan yapı... Bronchus lobaris superior dexter (sol radix pulmonis'te en üstte olan arteria pulmonalis)
- Sol akciğeri besleyen aa. bronchiales'ler hangi arterin dalı... Aorta thoracica (sağ akciğerin a. bronchialis'i, a. intercostalis posterior III'ün dalı)
- Sağ akciğeri drene eden bronşiyal venler, hangi vene

Temel Bilimler 3. soru
Tusdata Anatomi Hızlı Tekrar Kampı
1. Fasikül Sayfa 061

- Akciğerlerin lenfası... Sol akciğer alt lobunun lenfinin büyük bölümü ductus lymphaticus dexter'e dökülür (ductus thoracicus ile taşınmaz). Akciğerin lenf akım sırası: Nodi pulmonales (intrapulmonales), Nodi bronchopulmonales (hilares), Nodi tracheobronchiales, Nodi paratracheales, Truncus bronchomediastinalis
- Mediastinal plevranın duyusunu taşıyan sinir... N. phrenicus (diafragmatik plevranın da santral bölümünün duyusunu taşır)

