

Orijinal Soru: Temel Bilimler 84

84. Aşağıdaki böbrek tümörlerinden hangisi genellikle benign davranış gösteren epitelyal bir tümördür?

- A) Renomedüller interstisyel hücreli tümör
- B) Nefroblastoma
- C) Bellini duktus karsinomu
- D) Anjiyomiyolipom
- E) Onkositom

Doğru Cevap:E

KAMP NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR



TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

97

OTOZOMAL RESESİF (ÇOCUKLUK) POLİKİSTİK BÖBREK

- Doğumda görülür ve infantil dönemde böbrek yetmezliği gelişir.
- Böbrek kistleri korteks ve medulla yerleşimlidir ve böbreğe sünger görünümü verir.
- Vakaların hemen hepsinde karaciğerde kistler ve portal safra kanallarında proliferasyon ile karakterize konjenital hepatik fibrozis görülür. Yaşayan bebeklerde siroz gelişir.
- Fibrosistin kodlayan PKHD-1 geninde mutasyon görülür.

MEDULLANIN KİSTİK HASTALIKLARI

Nefronoftizis – Üremik Medüller Kistik Hastalık Kompleksi

- Medulla, özellikle de kortikomedüller hatta değişik sayıda kistler, belirgin kortikal atrofi ve interstisyel fibrozis vardır.
- Atrofi yüzünden böbrek küçülür (böbreği küçülten kistik hastalık).
- Juvenil nefronofitiziste, OR geçiş ve nefronosistin geninde mutasyon görülür.

Medüller Sünger Böbrek

- Genetik geçişi olmayan, böbrek yetmezliğine neden olmayan, renal kalsifikasyon, hematüri ile karakterize böbrek kistleridir.

DIYALİZE BAĞLI KİSTİK HASTALIK

- Diyaliz hastalarının % 75'inde 5 yıl içinde kistler gelişir.
- Bu kistlerden renal adenom ve renal hücreli kanser (papiller tip) gelişim riski mevcuttur.

BÖBREK TÜMÖRLERİ

BENİGN TÜMÖRLER

Renal Papiller Adenom

Temel Bilimler 84. soru
Tusdata Patoloji Kamp Notu 1. Fasikül Sayfa 097

Renal Onkositom

- Eozinofilik hücrelerden oluşan, bol mitokondri içeren tümördür.
- Toplayıcı kanalların interkalat hücrelerinden köken alır.
- Histolojide kromofob hücreli renal hücreli kanser ile karışır.

Anjiyomiyolipom

- Tuberoskleroz ile çok sık birliktelik gösterir.
- Nodüler kitle yapma eğilimi nedeniyle renal hücreli karsinomla karıştırılabilen tümöral lezyondur.

MALİGN TÜMÖRLER

Renal Hücreli Karsinom (Hipernefroma)

- Böbreğin en sık malign tümörüdür.
- Risk Faktörleri: İleri yaş, erkek, sigara içimi (en önemli faktör), obezite (özellikle kadınlarda), hipertansiyon, karşılanmamış östrojen tedavisi, diyaliz kistleri. Von Hippel-Lindau sendromuna eşlik edebilir.

İLGİLİ NOTLAR