

Orijinal Soru: Klinik Bilimler 189

189. Yirmi aylık erkek bebek acil servise ateş nedeniyle getiriliyor. Vücut sıcaklığı 38,5 °C olan bebeğin beş dakika süre ile gözlerini bir noktaya diktiği, her iki kol ve bacakta atım şeklinde jeneralize tonik klonik nöbet geçirdiği görülüyor. Öz ve soygeçmişinden, on altı aylıkken de aynı özellikte 3-5 dakika süren ateşli nöbet geçirdiği, babasının da çocukluk döneminde ateşli nöbetleri olduğu öğreniliyor. **Bu hastadaki en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Katılma nöbeti
- B) Basit febril konvülsiyon
- C) Komplike febril konvülsiyon
- D) Febril status epileptikus
- E) Epilepsi

Doğru Cevap: B

HIZLI TEKRAR NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

İLGİLİ NOTLAR

32

TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



- CMT'nin diğer adı...Peroneal kaslar atrofi veya Heredite motor duysal nöropati tip Iia (HMDN tip Iia)
- CMT (HMDN tip Iia) hastalığının en erken tuttuğu sinirler...Peroneal ve tibial sinirler
- CMT'nin tutmadığı sinirler...Kraniyel sinirler
- CMT hastalığından etkilenmeyen kaslar...Aksiyel kaslar tutulmaz
- Daha önce sağlıklıyken 14 yaşında ayağını kaldırmakta zorlanma yavaş ilerleyen güçsüzlük şikayetiyle gelen tibial bölgede sinirlerin palpe edildiği, CK seviyesi normal ve bacakları leylek bacağı gibi ince görülüyorsa tanı...CMT hastalığı
- CMT hastalığında tanı için yapılması gereken...Sural sinir biyopsisi
- CMT hastalığında sinir biyopsisinde görülen...Soğan zarı görünümü
- Kearns Sayre sendromunun özellikleri...
 - <20 yaş başlar
 - Oftalmopleji ve retinal dejenerasyon görülür
 - Kardiyak blok
 - Körlük-Sağırılık
 - BOS proteini >100 mg/dl
- Tekrarlayan inme atakları olan ve laktik asidozla birlikte kas biyopsisinde de ragged red fiber saptanan hastada tanı...MELAS sendromu

SORULAR

1. I. Maternal B12 eksikliği
II. Gebelikte ateşli enfeksiyon geçirmek
III. Maternal malnutrisyon
IV. Maternal Valproik asit kullanımı
- Yukarıdakilerden hangileri nöral tüp defekti görülme riskini arttırmaktadır?
- A) I ve II
 - B) II ve III
 - C) III ve IV
 - D) I ve IV
 - E) I, II, III ve IV
- Doğru cevap: E
2. Serebral palsi tipleri ve özellikleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
- A) Spastik tip-En sık görülen tiptir
 - B) Ekstrapiramidal tip-Kernikterusa sekonder görülür
 - C) Hemiplejik tip-En sık asfiksye sekonder görülür
 - D) Quadriplejik serebral palsi-En ağır tiptir
 - E) Diskinetik tip-Zeka genellikle normaldir
- Doğru cevap: C

3. Yirmi beş yaşındaki annenin birinci gebeliğinden 37 hafta sezeryan ile doğan bir erkek bebek solunum sıkıntısı ve hipotonik olması nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılıyor. Çekilen akciğer grafisinde kostalarının balık kılçığı gibi ince olduğu görülüyor. Takibinde dilde fasikülasyonu olduğu görülüyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Werdnig Hoffman hastalığı
- B) Kugelberg Welander hastalığı
- C) Duchenne kaslar distrofi
- D) Nemalin rod miyopatisi
- E) Spinal kaslar atrofi tip 2

Doğru cevap: A

4. Aşağıda verilen kas hastalıkları ve hatalı proteinlerin eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

- A) Duchenne kaslar distrofi-Distrofin
- B) Miyotonik kaslar distrofi-Alfa-distroglikan
- C) Limb Girdle kaslar distrofi-Sarkoglikan
- D) Emery-Dreifus kaslar distrofi-Laminin
- E) Konjenital kaslar distrofi-Merozin

Doğru cevap: B

5. I. Bulber kaslar
II. Gövde kasları
III. Üst ekstremité kasları
IV. Alt ekstremité

Guillain Barre sendromunda etkilenen kasların iyileşmesi genellikle hangi sıralamayla olmaktadır?

- A) I-II-III-IV
- B) I-III-II-IV
- C) II-III-I-IV
- D) IV-II-I-III
- E) IV-II-III-I

Doğru cevap: B

47. PAROKSİSMAL BOZUKLUKLAR VE 48. FEBRİL KONVÜLZYONLAR / EPİLEPSİ

Klinik Bilimler 189. soru
Tusdata Pediatri Hızlı Tekrar Notu 1.
Fasikül Sayfa 032

- Basit febril konvülsiyonlarda nöbet hangi tiptedir... Jeneralize
- Basit febril konvülsiyonun 15 dakikayı aşarsa...Komplike febril konvülsiyon olur
- Febril nöbet 24 saat içinde tekrarlıyorsa...Komplike febril nöbet olur
- Komplike febril nöbet mortalite riski...artar
- Febril konvülsiyonlarda LP endikasyonları...
 - <6 ay bebekler
 - 6-12 ay arasındaki aşısız çocuklar
 - Herhangi bir yaşta menenjit şüphesi varsa