

# Orijinal Soru: Klinik Bilimler 197

- 197.I. Histopatolojisinde en sık adenokarsinom görülür.  
II. Eş zamanlı kemoterapi ve radyoterapi ile tedavi başarısı yüksektir.  
III. Patogenezinde en sık Epstein – Barr virus (EBV) rol oynar.  
IV. Kadınlarda daha sık görülür.

Anal kanal kanserleriyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I  
B) Yalnız II  
C) I ve III  
D) II ve IV  
E) III ve IV

Doğru Cevap:D

## HIZLI TEKRAR NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR



GENEL CERRAHİ HIZLI TEKRAR

93

Eksternal hemoroid tedavisi	
Tromboze	<72 saat içinde ise: Trombektomi >72 saatten sonra ise: Diyet, ağrı kesiciler ve oturma banyosu
Non-tromboze	Diyet düzenlenmesi

Hemoroidlerde klinik	
Defekasyonu takiben görülen ağrısız ve parlak kırmızı renkte kanama	Internal hemoroidal hastalık (1,2 ve 3. derece)
Ağrılı hemoroidler	4. derece internal ve tromboze eksternal hemoroidler

- Hemoroidektominin en sık komplikasyonu... Üriner retansiyon
- Anal fissür... Anoderimde oluşan yırtık
- Anal fissür litotomi pozisyonunda... En sık posterior orta hatta saat 6 hizasında, ikinci sık lokalizasyon saat 12 hizası

Saat 6 ve 12 hizası dışındaki fissürler atipik lokalizasyonlu fissürlerdir.  
Öncelikle akla gelecek hastalık Crohn'dur.

- Atipik yerleşimli fissür görülebilen hastalıklar... Crohn hastalığı, epidermoid Ca, tüberküloz, sifilis, lösemik infiltrasyon, HIV
- Defekasyonu takiben görülen ağrılı ve parlak kırmızı renkte kanama... Anal Fissür

Kronik anal fissürlerin bileşenleri	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hipertrofiye anal polip</li><li>• Sentinel skin tag (deri çıkıntısı)</li><li>• Ülser (fissür)</li></ul>

- Anal fissür tanısı... Fizik muayene
- Anal fissür ameliyatı... Lateral internal sfinkterotomi (Internal sfinkter otonom sinir sistemi tarafından innerve edilir; istemsiz kasılır. Sfinkterotomi ile anal spazm engellenir)

Eksternal sfinkter kesilir ise inkontinans olur. Bu nedenle eksternal sfinktere dokunma!!!

- Anorektal apselerden sık görülen tipi... Perianal apse
- Anorektal apselerin en sık belirtisi... Ciddi anal ağrı

Anorektal apselerin tedavisi	
Cilt insizyonu ile drene edilenler	Perianal apseler İskiorektal apseler İskiorektal apselerin yukarı yayılımı sonucu gelişen supralevator apseler
İnternal sfinkterotomi ile drene edilenler	İntersfinkterik apseler
Rektumdan drene edilenler	İntersfinkterik apselerin yukarı yayılımı sonucu gelişen supralevator apseler

- Perianal fistülün en sık nedeni... Anorektal apseler
- En sık görülen perianal fistül... İntersfinkterik fistül

Perianal fistüllerin tedavisi	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Basit fistülde: Fistülotomi</li><li>• Fistül traktının tamamen çıkartılması: Fistülektomi</li><li>• Ekstrasfinkterik, suprasfinkterik ve iç ağız yüksek transsfinkterik fistüller: Seton</li></ul>

Klinik Bilimler 197. soru  
Tusdata Genel Cerrahi Hızlı Tekrar  
Notu 1. Fasikül Sayfa 093

- Kondiloma aküminata... Anogenital sığıl (HPV 6 ve 11 ile ilişkiler benign, HPV 16 ve 18 ile ilişkiler malign)
- Anal intraepitelyal neoplazi... Bowen hastalığı. Anüsün skuamöz karsinoma in situ
- Anüsün epidermoid karsinomları... Skuamöz hücreli karsinom, kloajenik karsinom, transizyonel karsinom ve bazaloid karsinom
- Anal kanalda gelişen malign tümörler içinde daha sık görülen... Skuamöz hücreli karsinom

Anal kanal yerleşimli epidermoid kanserlerin tedavisi	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kası (sfinkter) tutmuyor ise lokal eksizyon</li><li>• Kası tutuyor ise kombine kemoradyoterapi</li><li>• Nüks ise abdominoperineal rezeksiyon (APR)</li></ul>

- Verrüköz karsinom... Buschke-Lowenstein tümörü, dev kondiloma aküminata, kondiloma aküminatanın lokal agresif bir formu

HPV ile ilişkili anal kanal tümörleri	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skuamöz hücreli karsinom, Bowen hastalığı</li><li>• Kondiloma aküminata</li><li>• Dev kondilom, Verrüköz kanser veya Buschke-Lowenstein tümörü</li></ul>

- Anüsün Paget hastalığı... Perianal bölgedeki apokrin bezlerden kaynaklanan adenokarsinoma in situ

Bowen hastalığı: İn situ SCC Anüsün Paget hastalığı: İn situ adenokarsinom	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Deri ve gözden sonra melanomun en sık görüldüğü üçüncü yer... Rektum</li><li>• Melanomun GİS'te en sık yerleştiği yer... Rektum</li></ul>

## SORULAR

229. Aşağıdakilerden hangisi fekal inkontinans nedenlerinden biri değildir?

- A) Anorektal cerrahi girişimler  
B) Pudental sinir yaralanması  
C) Pelvis kırıkları  
D) Psödomembranöz enterokolit  
E) Doğum eylemi sırasında travma

Doğru cevap: D

## İLGİLİ NOTLAR