

# Orijinal Soru: Klinik Bilimler 210

210. Akut apandisit tanısında kullanılan "öksürmekle sağ alt kadranda ağrı oluşması" bulgusuna ne ad verilir?

- A) Obturator
- B) Dunphy
- C) Psoas
- D) Cullen
- E) Rovsing

Doğru Cevap: B

## DERS NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

(Bu referanslar; soru kitabı Tüm Tus Soruları, Kamp notlarımız ya da non spesifik slaytlardan DEĞİL, sadece güncel ders notlarımızdan verilmiştir. Bu notları şubelerimizde kolayca edinip, referansları kontrol edebilirsiniz.)

## İLGİLİ NOTLAR

622

TUS HAZ

Klinik Bilimler 210. soru  
Tusdata Genel Cerrahi Ders Notu 2.  
Fasikül Sayfa 622



### Dunphy Bulgusu

- ✓ Öksürmekle sağ alt kadranda ağrı olmasıdır.

### Rosenstein Bulgusu

- ✓ Hastanın sol tarafına yattığında ağrının artmasıdır.

### Aaron Bulgusu

- ✓ McBurney noktasına bastırıldığında epigastriumda ağrı duyulmasıdır.

### Rektal Muayene

- ✓ Mutlaka yapılmalıdır.
- ✓ Douglas boşluğunda (rektovezikal fossa) a. vermiformis varsa, rektal tuşede ağrı ya da kitle tespit edilir.

## TANI

- Tanı için iyi bir hikaye ve fizik muayene şarttır.
- Laboratuvar bulgularının tanıda pek yararı olmaz ama rutin yapılması gereken bazı testler vardır.
- **C-reaktif protein, bilirubin, IL-6 ve prokalsitonin** özellikle perforé apandisit tanısında etkili belirteçlerdir. Rutin başlangıç testleri beyaz küre ve CRP'dir. Doğum çağındaki kadınlarda gebelik testi mutlaka yapılmalıdır. Son olarak nefrolityazis ve pyelonefriti ekarte etmek için idrar tahlili anlamlı olabilir.

### Tam Kan Sayımı

- ✓ Özellikle beyaz küre sayısı önemlidir.
- ✓ Beyaz küre sayısı apandisitte 10,000-17,000/mm<sup>3</sup> arasında beklenir.
- ✓ Beyaz küre sayısı > 17,000/mm<sup>3</sup> olması, komplikasyon düşündürür; **gangrene veya perforé apandisit...**
- ✓ Vakaların %10'unda beyaz küre sayısı normaldir.
- ✓ Lökosit formülünde sola kayma nötrofeniklerde önemlidir.

### Tam İdrar Tahlili

- ✓ Genellikle normaldir.
- ✓ Apendiks mesane veya üreter yakınında ise idrarda beyaz küre ya da kırmızı küre görülebilir, ancak bakteriüri görülmez.
- ✓ Tam idrar tahlili idrar yolu hastalıklarını (**nefrolityazis veya piyelonefrit**) ekarte etmek amacıyla yapılır.

### Radyoloji

- ✓ Akut apandisit tanısında görüntüleme yöntemlerinin kullanılma şekli ve önceliği konusunda fikir birliği yoktur.
- ✓ En çok kabul edilen görüş; **klirik ve laboratuvar bulguları akut apandisit tanısını güçlü bir biçimde destekliyor ise -özellikle erkeklerde- görüntülemeye gerek olmadığı yönündedir.** Görüntüleme daha çok tartışmalı ve arada kalmış vakalarda uygundur.

### Direkt karın grafisi

- Akut karın şüphesi ile gelen hastalarda yapılabilir.
- Akut apandisit için duyarlılığı ve özgüllüğü çok düşüktür.