

Orijinal Soru: Klinik Bilimler 210

210. Akut apandisit tanısında kullanılan "öksürmekle sağ alt kadranda ağrı oluşması" bulgusuna ne ad verilir?

- A) Obturator
- B) Dunphy
- C) Psoas
- D) Cullen
- E) Rovsing

Doğru Cevap: B

KAMP NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

İLGİLİ NOTLAR

APENDİKS VERMİFORMİS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ

- Apendiks vermiformisin çekumla birleşme yeri (tabanı) değişmez, ama serbest ucu değişik lokalizasyonlar gösterebilir ve bu serbest ucun lokalizasyonuna göre de apandisitte değişik klinik tablolar ortaya çıkar. Serbest ucun en sık lokalizasyonu %60 **intraoperitoneal retroçekal'dir**; %30 pelvik ve %7-10 retroperitoneal yerleşimler görülür.

AKUT APANDİSİT

- Apendiks vermiformisin **akut inflamasyonudur**. Apendiksin giderek artan distansiyonu ile **venöz drenaj bozulur ve mukozal iskemi** gelişir. Tıkanma devam ederse, tam kat iskemi oluşur ve en sonunda **perforasyon** gelişir.
- Apendektomi tüm dünyada en sık yapılan acil ameliyattır. Yaşam boyu erkeklerde risk %8.6; kadınlarda risk: %6.7'dir. En sık 10'lu yaşlarda görülür.

ETİYOLOJİ

- **Obstrüksiyon (% 90)** → Apendiks vermiformis zaten dar bir organdır. En ufak bir partikül, lümenin tıkanmasına yol açabilir. Fekalitler (sertleşmiş, kristalleşmiş gaitalar) en sık nedendir. Lenfoid hipertrofi (özellikle çocuklarda) Parazitler (özellikle askaris)

BAKTERİYOLOJİ

Klinik Bilimler 210. soru
Tusdata Genel Cerrahi Kamp Notu 1. Fasikül Sayfa 193

KLİNİK BELİRTİLER

- Anoreksi, bulantı, kusma ve ateş görülür. Bölgesel inflamasyon ayrıca ileus, diyare, ince bağırsak tıkanıklığı ve hematüriye neden olur.
- **Anoreksi (İştahsızlık)** → Ağrıdan önce ortaya çıkar. İlk saptanan belirtidir.
- **Karın Ağrısı** → **Visseral fazda ağrı künt ve umbilikus etrafındadır**. Ortalama 4-6 saat (1-12 saat) sonra ağrı lokalize olur ve şiddetlenir. **Somatik fazda ağrı** sağ alt kadrana lokalize olur.
- **Bulantı, Kusma** → Kusma **ağrıdan sonra** ortaya çıkar. Eğer önce kusma, sonra ağrı olmuşsa, genellikle bu akut apandisit değildir.
- **Ateş** → Genellikle 38 derecenin üzerine çıkmaz. Eğer 39 dereceden yüksek ateş varsa, bir komplikasyon ortaya çıkmış demektir.
- **Hassasiyet** → sağ lat kadrana basıldığında ağrı olmasıdır
- **Defans (İstemsiz Kas Direnci)** → İstemsiz defans en değerli periton iritasyon bulgusudur.
- **Rovsing Belirtisi** → Sol alt kadrana basıldığında inen kolondaki gaz yukarı doğru elle karın üzerinden itilince, sağ alt kadranda ağrı ortaya çıkar.
- **Rosenstein Bulgusu** → Hastanın sol tarafına yattığında ağrının artmasıdır.
- **Obturator Testi** → Sağ uyluğa fleksiyon ve iç rotasyon yaptırılır.
- **İliopsoas (psoas) Testi** → Hasta sol yanına yatar ve sağ uyluk arkaya çekilir.
- **Ten-Horn Bulgusu** → Sağ testis aşağı doğru çekildiğinde sağ alt kadranda ağrı hissedilmesidir.
- **Dunphy Bulgusu** → Öksürmekle sağ alt kadranda ağrı olmasıdır.
- **Aaron Bulgusu** → McBurney noktasına bastırıldığında epigastriumda ağrı duyulmasıdır.