

Orijinal Soru: Klinik Bilimler 211

211. Laparoskopik apendektomi sonrası karın ağrısı, bulantı ve kusma şikâyetleriyle başvuran bir hastanın ultrasonografisinde ince bağırsağın antimezenterik duvarının bir bölümünün laparoskopik port yerinden cilt altına uzandığı ve strangüle olduğu tespit ediliyor. **Bu hastada tarif edilen en olası fitik aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Littre
- B) Richter
- C) Obturator
- D) Spigelian
- E) Amyand

Doğru Cevap: B

HIZLI TEKRAR NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

İLGİLİ NOTLAR

124

TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



134. KARIN DUVARI FITIKLARI

- **Fitik...** Karın duvarının zayıf noktalarından peritonla birlikte karın içi organların karının dışına (cilt altına) geçmesi
- **Fitik kesesi...** Fitiklaşan organı saran periton
- **Fitik kesesi içinde en çok bulunan organlar...** Omentum ve ince bağırsaklar
- **Karın ön duvarı fitikleri en sık ...** Kasıkta
- **Kasık fitikleri en sık...** Erkeklerde
- **Fitik prevalansı yaşla...** Artar

İnguinal fitiklerin özellikleri...

- Fitik boynu ne kadar dar ise komplikasyon ihtimali o kadar artar
- Kadın, erkek ve çocuklarda en sık görülen kasık fitiği indirekt inguinal hernidir
- Kasık fitikleri sağ tarafta daha sık görülür
- **Kasık fitiklerinden sonra ikinci sıklıkla...** İnsizyonel herniler ve sonrasında umbilikal herniler
- **İndirekt inguinal fitikler...** Konjenital ve prosessus vajinalisin tam kapanmaması sonucu gelişir.

Fitik etiyojisi

- Aile öyküsü; kasık fitiklerinin çoğu genetikdir
- Tüm indirekt inguinal fitikler konjenitaldir ve prosessus vajinalisin tam kapanmaması sonucu gelişir
- Kas yetmezliği (kepenk mekanizmasının bozulması)
- Transvers fasyanın yapısal malformasyonu
- Direkt hernilerde 2 major faktör:
 - Artmış intraabdominal basınç
 - Arka inguinal duvarın zayıflığı (transvers fasya zayıflığı)
- **Direkt inguinal herni...** Doku zayıflığı nedeni ile Hesselbach üçgeni içinden çıkan fitik
- **Direkt inguinal hernide fitik kesesi...** Inferior epigastrik damarların medialinde

İnguinal fitiğin NYHUS sınıflandırılması

Tip	Tanım
1	İndirekt inguinal herni Internal inguinal halka normal (örneğin, çocuk fitiği)
2	İndirekt inguinal herni Internal inguinal halka dilate ama arka inguinal duvar bozulmamış; inferior derin epigastrik damarlar yerinde
3	A Direkt inguinal herni
	B İndirekt inguinal herni internal inguinal halka dilate, medialde bozulmuş veya Hesselbach üçgeninin transvers fasyası bozulmuş (örneğin, skrotal, sliding veya pantolon herni)
	C Femoral herni
4	A Direkt rekürren herni
	B İndirekt rekürren herni
	C Femoral rekürren herni
	D Kombine rekürren herni

- **Pantolon herni...** Aynı tarafta hem direkt + indirekt herni
- **Femoral herni...** Inguinal ligamanın arkasından, femoral kılıf boyunca femoral damarların medialinde femoral kanala fitiklaşma
- **Femoral herni...** Kadınlarda daha sık

Klinik Bilimler 211. soru
Tusdata Genel Cerrahi Hızlı Tekrar
Notu 1. Fasikül Sayfa 124

- **Richter fitiği...** Bağırsağın sadece antimezenterik kenarının fitik kesesinin içine girmesi. Obstrüksiyon olmadan strangülasyon gelişir.
- **Richter fitiği...** En sık distal ileum, sağda, 60-70 yaşlarında ve femoral fitiği olan kadınlarda

"İnguinal herniler" başlıklı şekile bakınız.

