

# Orijinal Soru: Temel Bilimler 108

108. Kırk dört yaşındaki kadın hasta; baş ağrısı nedeniyle ibuprofen kullandıktan sonra gelişen, yaklaşık yarım saat içinde yer değiştiren kaşıntılı kızarıklıklar tanımlıyor. Dermatolojik muayenesinde baş, gövde ve ekstremitelerde, farklı boyutlarda, eritemli, ödemli, diskoid ve anüler plaklar izleniyor.

Bu hastada ibuprofen kullanımı durdurulduktan sonra öncelikli tedavi seçeneği aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Oral itrakonazol
- B) Oral loratadin
- C) Topikal permetrin
- D) Oral azitromisin
- E) Oral asiklovir

Doğru Cevap: B

## KAMP NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR



TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

119

### HİSTAMİNİK İLAÇLAR

Temel Bilimler 108. soru  
Tusdata Farmakoloji Kamp Notu 1. Fasikül Sayfa 119

#### ANTİHİSTAMİNİK İLAÇLAR

Nesile (= Jenerasyona) göre antihistaminiklerin (H1) sınıflaması

	Birinci nesiller	İkinci nesiller
Lipofilite	Fazla	Az
Santrale ve süte geçiş oranı	Fazla	Az
Sedatif etki	Fazla	Az
Lokal anestezi etki	Fazla	Az
Antikolinergik/ antiparkinson etki	Fazla	Az
Öncelikli endikasyonları	Allerji tedavisi Hareket hastalığı	Alerji Ürtiker

Temel Bilimler 108. soru  
Tusdata Farmakoloji Kamp Notu 1. Fasikül Sayfa 119

#### H1 Reseptör Blokörleri

- Kapiller permeabiliteyi ve ödemi azaltırlar. **Antialerjiktirler**, inflamasyonu baskırlar ve kaşıntıyı giderirler.
- **Lokal anestezi** etki oluşturabilirler.
- Alfa<sub>1</sub> reseptörleri bloke edebildikleri için ortostatik **hipotansiyon** oluşturabilirler.

Temel Bilimler 108. soru  
Tusdata Farmakoloji Kamp Notu 1. Fasikül Sayfa 119

#### Histamin H1 reseptör blokörleri

Birinci nesil	İkinci nesil
<b>Uzun etkililer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Meklizin</li><li>• Klorfeniramin</li><li>• Hidroksizin</li><li>• Doksepin</li><li>• Klemastin</li></ul> <b>Kısa etkililer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Karbinoksamin (en kısa etkili)</li><li>• Dimenhidrinat</li><li>• Difenhidramin</li><li>• Doksilamin</li><li>• Siklizin</li><li>• Prometazin (antidopaminerjik etkili ve en sedatif)</li><li>• Feniramin...</li></ul>	<b>Uzun etkililer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Loratadin (en uzun etkili)</li><li>• Desloratadin</li><li>• Astemizol</li></ul> <b>Orta etkililer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Setirizin</li><li>• Levosetirizin</li><li>• Feksofenadin</li><li>• Ketotifen</li></ul> <b>Kısa etkililer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Akrivastin</li><li>• Olapatadin</li><li>• Terfenadin</li></ul>

#### Hareket hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar

- **Antihistaminikler**: Prometazin, dimenhidrinat, meklizin, siklizin
- **Parasempatolitik**: Skopolamin (Hyosin) (en etkili)
- **Dikkat**: Tedavide metoklopramid etkisizdir. Bulantı-kusma tedavisi ile hareket hastalığı tedavisi farklı şeylerdir!

## İLGİLİ NOTLAR

“Bu konuyu” TUS sormaktan bıkmadı, biz anlatmaktan bıkmadık, lütfen siz de **çalışmaktan bıkmayın...**