

# Orijinal Soru: Klinik Bilimler 165

165. Üç yaşındaki kız çocuk göz çevresinde ve dudaklarda şişlik, solunum sıkıntısı yakınmalarıyla getiriliyor. Anjiyoödem düşünülen çocuğun fizik muayenesinde ürtikerinin olmadığı görülüyor.

Bu çocukta olası tanı için ilk istenecek tetkik aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Serum C4 düzeyi
- B) Serum triptaz düzeyi
- C) Serum histamin düzeyi
- D) Total IgE düzeyi
- E) İnhaler alerjen paneli

Doğru Cevap:A

## HIZLI TEKRAR NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

64

TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



- Kronik ürtikere en sık eşlik eden otoimmün hastalık... Hashimoto tiroiditi

Kronik ürtiker etiyolojisi	
İdiyopatik	Vakaların %60-70'i
İdiyopatik vakaların %35-40'ı IgG, anti-IgE ve anti-FcεRI (yüksek afinite IgE reseptör α zincir) otoantikorları taşır.	
Fiziksel (%30)	Dermografizm Kolinergik ürtiker Soğuk ürtikeri Gecikmiş basınç ürtikeri Solar ürtiker Vibratuvar ürtiker Akuajenik ürtiker
Otoimmün	SLE JRA Graves Hashimoto Çölyak hastalığı İnflamatuvar bağırsak hastalıkları Lökositoklastik vaskülit
Otoinflamatuvar/ periyodik ateş sendromları	NOMID (Neonatal onset multisystem otoinflamatuvar hastalık) Muckle-Wells sendromu FCAS (Ailevi soğuk otoinflamatuvar sendrom)
Neoplastik	Lenfoma Mastositoz Lösemi
Anjiyoödem	Hereditör anjiyoödem (OD kalıtılan C1- esteraz inhibitör eksikliği) Edinsel anjiyoödem Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri

- Akut ürtikerde ürtiker plakları bir yerde en fazla ne kadar süreyle kalır... 24 saat
- Bir günden uzun süren, baskıya solmayan ürtikeryal plak... Ürtikeryal vaskülit
- Papüler ürtikerin en sık nedeni... Böcek ısırığı
- Kronik ürtikerin otoimmün olup olmadığını anlamaya yarayan test... Otolog serum inokülasyon testi
- Hereditör anjiyoödem Tip 1 de temel patoloji... C1 esteraz inhibitörü eksik
- Hereditör anjiyoödem Tip 2 de temel patoloji... C1

Klinik Bilimler 165. soru  
Tusdata Pediatri Hızlı Tekrar 1.  
Fasikül Sayfa 064

- Hereditör anjiyoödemde klinik... Ödem; ekstremitelerde, yüzde, batında (karın ağrısı, kusma), solunum yollarında (solunum sıkıntısı)
- Hereditör anjiyoödemde ödem atakları en fazla ne kadar sürer... 1-7 gün (ortalama 72 saat)
- Hereditör anjiyoödemde laboratuvar bulgusu... C4 düşüklüğü (her zaman), C2 düşüklüğü (sadece atakta), CH50 düşüklüğü, C3 hep normaldir.
- Hereditör anjiyoödemde atak tedavisinde ne kullanılır?... C1 esteraz inhibitörü, Taze donmuş plazma, Ekallantid, İkatibant
- Atak tedavisinde kullanılan kallikrein antagonisti... Ekallantid
- Atak tedavisinde kullanılan bradikinin antagonisti... İkatibant
- Hereditör anjiyoödemde profilaksisinde ne kullanılır?... C1 esteraz inhibitörü, Danazol, Epsilon aminokaproik asit

## SORULAR

1. Beta blokör kullanmakta olan hastalarda anafilaksi tedavisinde epinefrine yanıt alınamayabilir. Bu durumda hastanın tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi tercih edilmelidir?

- A) Glukagon
- B) Antihistaminikler
- C) Glukokortikoidler
- D) ACTH
- E) Dopamin

Doğru cevap: A

2. Penisilin enjeksiyonu sonrası anafilaksi geçirme şüphesi ile acil müdahale edilen hasta olaydan 2 saat sonra görülüyor. Anafilaksi tanısı için aşağıdakilerden hangisine bakmak yararlıdır?

- A) Serum histamin düzeyi
- B) Serum triptaz düzeyi
- C) Serum IL4 düzeyi
- D) Serum IL5 düzeyi
- E) Serum bradikinin düzeyi

Doğru cevap: B

3. Oniki yaşında ve tekrarlayan streptokok farenjiti hikayesi olan çocuk yine boğaz ağrısı şikayeti ile getiriliyor. Hızlı streptokok test sonucu pozitif bulunarak ilk dozu ofiste verilme üzere oral amoksisilin başlanıyor. Bir saat sonra ağız çevresinde garip bir his ve karıncalanma hissediyor göz kapaklarında dudakta şişlik ve vücutta kaşıntılı kırmızı plaklar oluşuyor. Arkasından yutma güçlüğü ve ses kalınlığı geliyor. Nabız: 130/dakika, solunum sayısı: 32/dakika, kan basıncı: 70/30 mmHg, ateş: 37,2°C olarak saptanıyor.

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Amoksisiline bağlı ürtiker
- B) Amoksisiline bağlı ürtiker ve anjiyoödem
- C) Amoksisiline bağlı anafilaksi
- D) Amoksisiline bağlı anafilaktoid reaksiyon
- E) Hereditör anjiyoödem

Doğru cevap: C

4. Kronik idiyopatik ürtiker ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Sistemik hastalık bulguları siktir
- B) Fiziksel ürtiker tipidir
- C) Antitiroid antikor varlığı daha siktir
- D) Otolog deri testi negatiftir
- E) Laringeal ödem sık rastlanan bir bulgudur

Doğru cevap: C

5. Aşağıdakilerden hangisi, kronik ürtiker kriteridir?

- A) İki hafta süreyle haftada en az üç atak
- B) Üç hafta süreyle haftada en az iki atak
- C) Dört hafta süreyle haftada en az üç atak
- D) Beş hafta süreyle haftada en az iki atak
- E) Altı hafta süreyle haftada en az iki atak

Doğru cevap: E

## İLGİLİ NOTLAR

Hereditör anjiyoödem kliniğini ve tanısında C4 bakmamız gerektiğini eksiksiz olarak anlatmışız