

Orijinal Soru: Klinik Bilimler 179


179. Bebekliğinden bu yana tekrarlayan bronşiyolit yakınmaları olan ve hışıltı nedeniyle izleme alınan 3 yaşındaki erkek çocuk kreşe başlayınca yakınmalarının artması nedeniyle getiriliyor.

Aşağıdakilerden hangisinin, bu çocuktaki yakınmaların ilköğretim çağına devam etmesine yol açması en az olasıdır?

- A) Annede astım olması
- B) Çocukta alerjik rinit olması
- C) Çocukta atopik dermatit olması
- D) Çocukta besin alerjisi olması
- E) Çocukta adenoid vejetasyon olması

Doğru Cevap: E

KAMP NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR



Astımda Kontrol Edici Tedavi



Klinik Bilimler 179. soru
Tusdata Pediatri Kamp Notu 1. Fasikül Sayfa 193

Okul öncesi yaş grubunda Astım riski yönünden ölçütler

Majör ölçütler

- Anne ve babada astım
- Doktor tarafından tanı konmuş atopik dermatit
- İnhalen allerjen duyarlılığı

Minör ölçütler

- Doktor tarafından tanı konmuş alerjik rinit
- Soğuk algınlığı olmadan hışıltı
- Eozinofili (>%4)
- Gıda allerjen duyarlılığı

1 Majör veya 2 minör kriterin bulunması pozitif kabul edilir.

İLGİLİ NOTLAR

Okul öncesi yaş grubunda hışıltı ataklarının persiste edip etmeyeceği bu gördüğünüz kriterler ile öngörülmektedir.