

Orijinal Soru: Klinik Bilimler 220

220.Skrotumda ani başlayan ağrı, şişlik ve kızarıklık şikâyetleriyle acil servise getirilen bir çocukta ayırıcı tanıya yönelik aşağıdakilerden hangisinin istenmesi en uygundur?

- A) Manyetik rezonans görüntüleme
- B) Tam idrar tahlili
- C) Bilgisayarlı tomografi
- D) Doppler ultrasonografi
- E) Testis sintigrafisi

Doğru Cevap:D

KAMP NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

İLGİLİ NOTLAR



TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

179

MESANENİN ANOMALİLERİ

Ekstrofi Vezika

- Ürogenital sinüsün komplet ventral defektidir.
- Beraberinde en sık **epispadias** görülür.
- Zemininde **adenokarsinom** gelişebilir.

Kalıcı Urakus

- Urakusun, mesanenin kaudale inmemesi nedeniyle kalıcı olmasıdır.
- Urakus kistinden **adenokanser** gelişebilir.

İNTRASKROTAL KİTLELER

Spermatosel

- Rete testis, efferent duktus veya epididimden kaynaklanan, ağrısız, sperm içeren kistik bir kitledir.
- Testisin superiorunda ve posteriorunda testisten ayrı bir kitledir.
- Tedavi gerekmez.

Varikosel

- **Pampiniform pleksus venlerinin** kistik dilatasyonudur.
- **Renal ven içi basıncın daha yüksek olması ve inkompetan valflerin solda daha fazla olması nedeniyle** solda daha çok görülür.
- Genelde gençlerde görülür.
- **Eğer yaşlılarda ve sağ tarafta görülürse tümör yönünden araştırılmalıdır.**
- Tedavide: İnternal inguinal ring seviyesinde spermatik ven bağlanır.
- Tedavi edilmezse, **testiküler atrofi ve infertilite** gelişebilir.

Hidroset

- Tunica vaginalis içinde sıvı toplanmasına denir.
- Genelde 40 yaşından sonra görülür; ama patent processus vaginalis'i olan infantlarda hidroset görülebilir.
- Epididimoorşite sekonder oluşabileceği gibi, testis tümörlerinde de görülebilir.
- Genelde ağrısızdır.
- Büyük ve rahatsızlık veriyorsa çıkarılabilir.

Klinik Bilimler 220. soru
Tusdata Küçük Stajlar Kamp Notu 1. Fasikül Sayfa 179

Spermatik Kord Torsiyonu

- Sol testisin saatin ters yönünde, sağ testisin saat yönünde dönmesi sonucu oluşur.
- En sık 12-18 yaşları arasında görülür.
- Testis kan akımının strangülasyonu nedeniyle 3-4 saatte testiküler atrofi gelişebilir.
- İnmemiş testiste daha sık görülür.
- Testis şiş ve hassastır.
- Akut epididimit ile karışabilir. Akut epididimite testis eleve edildiğinde ağrı azalabilir (Prehn işareti). Ancak bunun sensitivitesi ve spesifitesisi yüksek değildir.
- **Doppler USG ile kan akımının olup olmadığı gösterilmelidir.**