

Orijinal Soru: Klinik Bilimler 224

224. Erkek infertilitesinin cerrahi olarak düzeltilebilir en sık nedenleri arasında yer alan, pampiniform pleksus venöz yapılarında dilatasyon olan, sol tarafta daha sık görülen ve bazen testiküler ağrıya neden olan patoloji aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Orkialji
- B) Testis tüberkülozu
- C) Spermatozel
- D) Varikozel
- E) Epididimoorşit

Doğru Cevap: D

KAMP NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR



TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

179

MESANENİN ANOMALİLERİ

Ekstrofi Vezika

- Ürogenital sinüsün komplet ventral defektidir.
- Beraberinde en sık **epispadias** görülür.
- Zemininde **adenokarsinom** gelişebilir.

Kalıcı Urakus

- Urakusun, mesanenin kaudale inmemeşi nedeniyle kalıcı olmasıdır.
- Urakus kistinden **adenokanser** gelişebilir.

İNTRASKROTAL KİTLELER

Spermatozel

- Rete testis, efferent duktus veya epididimden kaynaklanan, ağrısız, sperm içeren kistik bir kitledir.

Klinik Bilimler 224. soru
Tusdata Küçük Stajlar Kamp Notu 1. Fasikül Sayfa 179

Varikozel

- **Pampiniform pleksus venlerinin** kistik dilatasyonudur.
- **Renal ven içi basıncın daha yüksek olması ve inkompetan valflerin solda daha fazla olması nedeniyle** solda daha çok görülür.
- Genelde gençlerde görülür.
- **Eğer yaşlılarda ve sağ tarafta görülürse tümör yönünden araştırılmalıdır.**
- Tedavide: İnternal inguinal ring seviyesinde spermatic ven bağlanır.
- Tedavi edilmezse, **testiküler atrofi ve infertilite** gelişebilir.

Hidrozel

- Tunica vaginalis içinde sıvı toplanmasına denir.
- Genelde 40 yaşından sonra görülür; ama patent processus vaginalis'i olan infantlarda hidrozel görülebilir.
- Epididimoorşite sekonder oluşabileceği gibi, testis tümörlerinde de görülebilir.
- Genelde ağrısızdır.
- Büyük ve rahatsızlık veriyorsa çıkarılabilir.
- Çocuklarda 1 yaşına kadar rezorbe olur.
- Translüminasyon verir.

Spermatic Kord Torsiyonu

- Sol testisin saatin ters yönünde, sağ testisin saat yönünde dönmesi sonucu oluşur.
- En sık 12-18 yaşları arasında görülür.
- Testis kan akımının strangülasyonu nedeniyle 3-4 saatte testiküler atrofi gelişebilir.
- İnmemiş testiste daha sık görülür.
- Testis şiş ve hassastır.
- Akut epididimit ile karışabilir. Akut epididimite testis eleve edildiğinde ağrı azalabilir (Prehn işareti). Ancak bunun sensitivitesi ve spesifitesisi yüksek değildir.
- **Doppler USG ile kan akımının olup olmadığı gösterilmelidir.**

İLGİLİ NOTLAR

Notumuzdaki ilk ve bold yazılmış cümle soruyu çözmek yeterli ama gerisinde notta var :)