

Orijinal Soru: Klinik Bilimler 239

239.Serviks kanseri aşağıdaki lenf nodlarından hangisine daha sık metastaz yapar?

- A) İnguinal
- B) Obturator
- C) Sakral
- D) Femoral
- E) Paraaortik

Doğru Cevap:B

DERS NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

(Bu referanslar; soru kitabı Tüm Tus Soruları, Kamp notlarımız ya da non spesifik slaytlardan DEĞİL, sadece güncel ders notlarımızdan verilmiştir. Bu notları şubelerimizde kolayca edinip, referansları kontrol edebilirsiniz.)

İLGİLİ NOTLAR

262

TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



Klinik

- Serviks kanseri sıklıkla **ileri evre hastalık oluşana kadar asemptomatik kalır**. Serviks kanserinin **en sık semptomu ise anormal vajinal kanamadır**. Bu kanamalar, **postkoital (en sık)**, **intermenstruel** veya **postmenopozal** kanama şeklinde olabilir. Büyük tümörler kanamadan önce sıklıkla enfekte olup bazen kötü kokulu vajinal akıntıya neden olabilir.
- İleri evre tümörlerde pelvik ağrı, barsak veya mesaneye bası semptomları veya vajenden gayta ya da idrar gelmesi gibi semptomlar görülebilir.

Yayılım

Direkt invazyon

Klinik Bilimler 239. soru
Tusdata Kadın Doğum Ders Notu 2. Fasikül Sayfa 262

Lenfatik metastaz

- Serviksin lenfatik drenajı temel olarak **paraservikal ve parametrial** lenf nodlarına drene olmaktadır. Paraservikal ve parametrial lenf nodlarından lenfatik drenaj ise **obturator** lenf nodlarına, **internal, eksternal, ana iliak lenf** nodlarına ve en son olarak **paraaortik** lenf nodlarına drene olmaktadır. **İnguinal lenf nodları primer olarak tutulmazlar (E 98)**.

Serviks uterusunun lenfatik drenajı (N-88, N-90, N-91)

- a) Primer lenf grubu
 1. Paraservikal ve parametrial nodlar (ilk tutulan lenf nodu)
 2. Obturator nodlar
 3. İnternal iliak (hipogastrik) nodlar
 4. Eksternal iliak nodlar
 5. Sakral nodlar
- b) Sekonder lenf grubu
 1. Ana iliak nodlar
 2. Paraaortik nodlar

Hematojen metastaz

- Ancak ileri dönemlerde görülür. Bu yolla **en sık karaciğere, takiben akciğer ve kemiğe (özellikle vertebra)** metastaz olur.

İntraperitoneal implantasyon