

Orijinal Soru: Temel Bilimler 9


9. Nörolojik muayenesinde yüzün kulak kepçesinin hemen ön tarafındaki bölgesinden duyu alınmadığı tespit edilen bir hastada, harabiyeti en olası anatomik yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nervus auricularis magnus
- B) Nervus auriculotemporalis
- C) Nervus occipitalis major
- D) Nervus occipitalis minor
- E) Nervus infraorbitalis

Doğru Cevap: B

KAMP NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

Temel Bilimler 9. soru
Tusdata Anatomi Kamp Notu 1.
Fasikül Sayfa 236



N. trigeminus felcinde: İlgili sinir dalının dağıldığı bölgede **duyu kayıplarına** ek olarak;

- **Kornea** (ophthalmicus) ve **aksırma** (maxillaris) refleksleri kaybı görülür.
- **Çiğneme kasları felci** nedeniyle çene açıldığında lezyon tarafına deviyeye olur.

N. ophthalmicus (V₁): Sadece sensitif lif içerir. Dalları fissura orbitalis superior'dan geçerek **orbita**'ya girer.

- Göz küresi, conjunctiva, gl. lacrimalis, üst göz kapakları, alın derisi, paranasal sinüsler, burun mukozasının bir bölümü, burun kökü, sırtı ve ucundan duyu alır. Ayrıca dura mater (tentorium cerebelli dahil) ve scalp'dan da duyu taşır.

N. maxillaris (V₂): Sadece sensitif lif içerir. For. rotundum'dan geçerek **fossa pterygopalatina**'ya girer.

- Yüzün orta bölümü, alt göz kapakları, burnun kanatları, üst dudak derisi, nazofarinks, sinus maxillaris, tonsilla palatina,

Temel Bilimler 9. soru

Tusdata Anatomi Kamp Notu 1. Fasikül Sayfa 236

- **N. auriculotemporalis;** sinirin **arkaya dönen tek dalıdır**: A. meningeo media etrafında halka yapar. Kulak derisi, dış kulak yolu, kulak zarı, art. temporomandibularis ve temporal bölge derisinden duyu alır.

- **N. buccalis;** yanak derisinden duyu alır.

- **N. lingualis;** dilin 2/3 ön kısmının genel duyusunu taşır. Ayrıca chorda tympani'yi de taşır.

- **N. alveolaris inferior;** alt çene dişleri, alt dudak (n. mentalis) ve ağzın altında kalan bölgenin duyusunu alan dallar verir. M. mylohyoideus ve m. digastricus venter anterior'u innerve eden n. mylohyoideus bu sinirin dalıdır.

• **Trigeminal nöralji (tic douloureux);** n. trigeminus'un duyu kökünü etkileyen bir hastalıktır. Sinirin duyu alanlarında paroksizmal, şiddetli ağrı atakları ile karakterizedir. Özellikle maksiller sinirin dağılım alanında olur.

• **Frey sendromu (auriculotemporal sendrom);** yemek yerken veya yiyecek bir madde düşünülürken tek taraflı yanakta sıcaklık artışı ve terleme ile karakterizedir. Aberran rejenerasyon sonucudur. Parotis ile ilgili kesik parasempatikler hatalı olarak kesik simpatiklerle birleşir.

İLGİLİ NOTLAR

Referansımız **yanlış şıkları eyletmekle** kalmıyor, doğru seçeneği de **nokta atışı** gösteriyor.