

# Orijinal Soru: Klinik Bilimler 131

131 Ani ayağa kalkma ile, kronik primer mitral yetersizliği (KPMY) ve mitral prolapsusuna (MVP) bağlı mitral yetersizliği üfürümlerindeki değişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) KPMY üfürümü şiddetlenir, MVP üfürümü hafifler.
- B) KPMY üfürümü hafifler, MVP üfürümü uzar.
- C) KPMY üfürümü şiddetlenir, MVP üfürümü kısalır.
- D) KPMY üfürümü hafifler, MVP üfürümü kısalır.
- E) KPMY üfürümü şiddetlenir, MVP üfürümü uzar.

Doğru Cevap:B

## KAMP NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

Klinik Bilimler 131. soru  
Dahiliye Kamp Notu 1. Fasikül Sayfa 127

**Klinik**

- Fizik muayenede **midsistolik klik** ve **geç sistolik üfürüm** karakteristiktir.
- **Ayağa kalkmakla ve valsalva manevrasıyla venöz dönüş azalır** ve sonuçta sol atriyumun basıncı azalır. Buna bağlı olarak mitral kapak daha erken prolabe olur (Klik sesi S1'e yaklaşır). **Böylece üfürümün süresi uzar ve belirginleşir.**

**Tedavi:** Medikal tedavide ilk tercih **beta blokördür.**

Klinik Bilimler 131. soru  
Dahiliye Kamp Notu 1. Fasikül Sayfa 106

• **Venöz dönüş değişiklikleri:**

- ✓ **Venöz dönüşü azaltan durumlarda** (Valsalva manevrası ve ayakta durma): Normalde üfürümün şiddeti azalır. **Ancak Hipertrofik kardiyomiyopati (İHSS) ve MVP üfürümü şiddetlenir.**
- ✓ **Venöz dönüşü artıran durumlarda** (Çömelleme, bacakları kaldırma): Normalde üfürümün şiddeti artar **Ancak hipertrofik kardiyomiyopati (İHSS) ve MVP üfürümlerinin şiddeti azalır.**

**NARIZ TIBLEDİ VE ÖZELLİKLİDİ**

## İLGİLİ NOTLAR

Sorunun cevabı ile ilgili referansımız net bir şekilde ortada. Fazla söze ne hacet...