

# Orijinal Soru: Klinik Bilimler 210

210. Otuz beş yaşındaki erkek hasta ara ara olan rektal kanama şikâyetiyle polikliniğe başvuruyor. Yapılan rektal muayenesinde grade 4 internal hemoroid pakeleri olduğu görülüyor.

Bu hasta için **en uygun** tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Medikal tedavi
- B) Band ligasyonu
- C) Skleroterapi
- D) İnfrared fotokoagülasyon
- E) Hemoroidektomi

Doğru Cevap: E

## DERS NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

(Bu referanslar; soru kitabı Tüm Tus Soruları, Kamp notlarımız ya da non spesifik slaytlardan DEĞİL, sadece güncel ders notlarımızdan verilmiştir. Bu notları şubelerimizde kolayca edininip, referansları kontrol edebilirsiniz.)

596

TUS HAZ

Klinik Bilimler 210. soru  
Genel cerrahi 2022 ders notu 2. Fasikül Sayfa 596

### Eksizyonel hemoroidektomi

- ✓ Üç ve 4. derece internal hemoroidler ve mikst hemoroidlerde ameliyat uygundur.

### Trombektomi (tromboze eksternal hemoroidlerde)

- ✓ **Tromboze eksternal hemoroidler ilk 24-72 saat içinde** şiddetli ağrıya yol açar.  
Bu dönemde **trombektomi** kolaylıkla uygulanabilen etkin tedavidir.
- ✓ **Hasta geç başvurursa (72 saat sonra)** tromboz ve ağrı kendiliğinden gerilemeye başladığından **trombektomiye gerek kalmaz.**
- ✓ Oturma banyosu ve analjezikler yeterlidir.

### Stapler ile hemoroidopeksi

- ✓ Daha az postoperatif ağrının görüldüğü bir prosedürdür. Özellikle hemoroidal hastalığa mukozal prolapsus eşlik ediyorsa tercih edilebilir.

### Hemoroidektomi ameliyatları

Hemoroidektomi ameliyatları	
Kapalı submukozal hemoroidektomi	Parks veya Ferguson
Açık hemoroidektomi	Milligan ve Morgan
Çevresel hemoroidektomi	Whitehead
Stapler ile hemoroidopeksi	Longo

### Hemoroidektomi komplikasyonları

- ✓ **Üriner retansiyon: En sık komplikasyon ( %10-50)**
- ✓ Fekal inkontinans veya defekasyon güçlüğü
- ✓ **Enfeksiyon:** Şiddetli ağrı, ateş ve üriner retansiyon erken belirtileri olabilmektedir.
- ✓ **Masif kanama:** Postoperatif erken dönemde (sıklıkla uyanma salonunda)
- ✓ **Gecikmiş kanama:** 7-10 gün sonra
- ✓ **Striktür ve ektropion:** Uzun dönemde görülen komplikasyonlardır. Ektropion özellikle Whitehead ameliyatından sonra görülür.

### Hemoroid hastalığı tedavi algoritması

Eksternal hemoroid tedavisi	
Tromboze	Non-tromboze
<ul style="list-style-type: none"><li>• &lt; 72 saat → Trombektomi</li><li>• &gt; 72 saat → Diyet düzenlemesi, ağrı kesici tedaviler, oturma banyosu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diyet düzenlemesi</li><li>• Büyük, kötü hijyen, ağrılı → Eksizyon düşün</li></ul>

İnternal hemoroid tedavisi	
1. Derece	Diyet düzenlemesi / bant

Klinik Bilimler 210. soru  
Genel cerrahi 2022 ders notu 2. Fasikül Sayfa 596

4. Derece	Cerrahi
-----------	---------

## İLGİLİ NOTLAR

Net bilgi candır.