

Orijinal Soru: Klinik Bilimler 210

210. Otuz beş yaşındaki erkek hasta ara ara olan rektal kanama şikâyetiyle polikliniğe başvuruyor. Yapılan rektal muayenesinde grade 4 internal hemoroid pakeleri olduğu görülüyor.

Bu hasta için **en uygun** tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Medikal tedavi
- B) Band ligasyonu
- C) Skleroterapi
- D) İnfrared fotokoagülasyon
- E) Hemoroidektomi

Doğru Cevap: E

HIZLI TEKRAR NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

İLGİLİ NOTLAR

92

TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



228. Akut apandisit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Akut apandisitte, inflame apendiks duvarından alınan doku biyopsilerinde sıklıkla *Escherichia coli* ve *Bacterioides fragilis* ürer.
- B) Perfore apandisit nedeniyle ameliyat edilmiş kişilere, ameliyat sonrası intravenöz antibiyotik tedavisinin 24 saat uygulanması yeterlidir.
- C) Yaşlılarda tipik olmayan klinik tabloya bağlı olarak perforasyon oranı genç hasta grubuna göre daha yüksektir.
- D) Gebe kadınlarda gözlenen fizyolojik lökositoz, lökosit artışının akut apandisitteki tanısal değerini azaltabilir.
- E) Akut apandisitte baskın etiyolojik etken lümenin tıkanmasıdır.

Doğru cevap: B

PERİANAL BÖLGE HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ

104. PERİANAL BÖLGE ANATOMİSİ

Dentat çizgi	
İnnervasyonu	Üst kısım: Otonom sinir sistemi
	Alt kısım: Somatik sinir sistemi
Epiteli (Mukoza)	Üst kısım: Kolumnar epitel
	Alt kısım: Modifiye deri
Üst kısmında mukozal kıvrımlar vardır ve Morgagni kolonları denir, internal hemoroidal plexusu örter	
Üzerine anal glandlar açılır ve bunlardan apse ile fistüller gelişebilir	

- **İnternal sfinkter**... Rektumun iç sirküler kasının devamı olup otonom innervasyonlu, istemsiz düz kas
- **Eksternal sfinkter**... Somatik innervasyonlu, istemli kontrolü olan çizgili kas
- **Anüsün istirahat halindeki basıncı**... % 20'sinden eksternal sfinkter, %80'inden internal sfinkter sorumlu
- **Sıkma basıncı**... % 100 sorumlu olan eksternal sfinkter
- **Rektumun arterleri**...

Rektumun arterleri	
Üst 1/3 rektum	İMA'den gelen Süperior rektal arter
Orta 1/3 rektum	İnternal iliak arterden gelen orta rektal arter
Alt 1/3 rektum	İnternal pudental arterden gelen inferior rektal arter

- **Pektinat çizginin altında lenfatikler**... Paraaortik ve inguinal lenf nodlarına drene olur

105. ANOREKTAL BÖLGE BENİGN HASTALIKLARI

- **Anal inkontinans en sık nedeni**...

Anal inkontinansın en sık nedeni mekanik nedenler, genelde travmaya (**en sık obstetrik yaralanma**) bağlıdır

- **Anal inkontinans tanısı**... Anal manometri ve EMG
- **Eksternal sfinkter hasarını en iyi gösteren tetkik**... Endosonografi
- **Rektal prolapsus**... Rektumun çevre anüsten dışarı çıkması

Rektal prolapsus riskini arttıran faktörler

- Kadın cinsiyet
- 40 yaşından büyük olmak
- Vajinal doğum
- Multiparite
- Geçirilmiş pelvik cerrahi
- Kronik kabızlık
- Demans
- **Pelvik taban anatomik defektleri**: Levator ani diyastazi, anormal derecede derin cul-de-sac, aşırı uzun bir sigmoid kolon, gevşek bir anal sfinkter ve rektal sakral bağların kaybı
- **Rektal prolapsus semptomları**... Anorektal ağrı, kanama, mukuslu akıntı, inkontinans
- **Hemoroid**... Anal kanalda vasküler dokulardan zengin, elastik lifler içeren yastıkcıklar
- **Litotomi pozisyonunda hemoroid pakeleri**... Saat 3, 7 ve 11 hizasında

Klinik Bilimler 210. soru
Genel cerrahin Hızlı Tekrar 1. Fasikül
Sayfa 092

İnternal hemoroid sınıflaması

1. Derece	Ağrısız kanar.
2. Derece	Ağrısız kanar, prolabe olur, spontan redükte olur.
3. Derece	Ağrısız kanar, prolabe olur, elle redükte olur.
4. Derece	Kanar, prolabe olur, redükte olmaz . Ameliyat endikedir.

İnternal hemoroid tedavisi

1. Derece	Diyet düzenlenmesi, bant ligasyonu, fotokoagülasyon, skleroterapi
2. Derece	Diyet düzenlenmesi, bant ligasyonu, fotokoagülasyon, skleroterapi
3. Derece	Bant ligasyonu, skleroterapi, cerrahi (hemoroidektomi)
4. Derece	Cerrahi (hemoroidektomi)

- **Eksternal hemoroidler**... Inferior rektal venlerin dilatasyonu sonucu gelişir