

# Orijinal Soru: Temel Bilimler 92

92. Otuz yıldır kontrolüz hipertansiyonu olan 65 yaşındaki erkek hastanın malign hipertansif bir atağı takiben ani ölümü sonrasında yapılan otopside, beyinde aşağıdakilerden hangisinin saptanması en az olasıdır?

- A) Epidural hematom
- B) Küçük arter ve arteriollerde fibrinoid nekroz
- C) Lakuner enfarkt alanları
- D) Yarıklar şeklinde kanama odakları
- E) Derin beyaz cevherde kanama

Doğru Cevap:A

## HIZLI TEKRAR NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR



### PATOLOJİ HIZLI TEKRAR

73

#### SORULAR

294. Spontan intraparakimial kanamanın en sık görülen nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Berry anevrizmaları
  - B) Hipertansiyon
  - C) Intrakraniyal tümörler
  - D) Arteriyovenöz malformasyon
  - E) Serebral amiloid anjiyopati

Doğru cevap: B

295. Hipertansiyonun, aşağıda verilen beyin lezyonlarından hangisine neden olması beklenmez?
- A) Lakuner enfarkt
  - B) Hiyal arteriyoloskleroz
  - C) İntraserebral kanama
  - D) Demiyelinizasyon
  - E) Subdural hematom

Doğru cevap: E

296. Spontan subaraknoid kanamanın en sık görülen nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Berry anevrizması
  - B) Serebral amiloid anjiyopati
  - C) Arteriyovenöz malformasyon
  - D) Primer santral sinir sistemi vaskülitisi
  - E) Charcot-Bouchard mikroanevrizması

Doğru cevap: A

297. Aşağıdakilerden hangisi Berry anevrizmalarının gelişiminde predispozan bir faktör olarak kabul edilmez?
- A) Fibromusküler displazi
  - B) Marfan sendromu
  - C) Arteriyovenöz malformasyon
  - D) Ehlers-Danlos sendromu
  - E) Otozomal resesif polikistik böbrek hastalığı

Doğru cevap: E

298. Berry anevrizmasının yerleştiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Willis poligonu
  - B) Femoral arter
  - C) Temporal arter
  - D) Internal karotid arter

#### Temel Bilimler 92. soru

#### Patoloji Hızlı Tekrar 1. Fasikül Sayfa

073

- Kafa travması sonrasında temporal kemik skuamöz parça kırıkları sonucu arteria meningea media rüptürüyle oluşan kanama kansidir... Epidural kanama
- Kafa travması sonrasında en fazla görülen kanama hangisidir... Kamçı hareketi sonrasında köprü venlerin yırtılması sonucu görülen subdural hematom
- Kafa travması sonrası beyinde anatomik defekt olmadan geçici olarak bilinc kaybı ve paralizinin olmasına ne denir... Concussion
- Kafanın kamçı hareketlerinde serebral beyaz maddededeki nöronların aksonları gerilmeye bağlı olarak kopması ve kalıcı bitkisel hayat ile karakterize durum hangisidir... Difüz aksonal hasar

#### SORULAR

299. Künt travma sonucu gelişen temporal kemik kırığında, orta meningeal arterin yaralanması sonucu aşağıdakilerden hangisinin gelişmesi en olasıdır?
- A) Subaraknoid kanama
  - B) Epidural kanama
  - C) Akut subdural kanama
  - D) Kronik subdural kanama
  - E) Diffüz aksonal hasar

Doğru cevap: B

300. Sarsılmış bebek sendromunda beyinde gelişmesi en olası lezyon aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Epidural kanama
  - B) Subdural kanama
  - C) Subaraknoid kanama
  - D) Laserasyon
  - E) Diffüz aksonal hasar

Doğru cevap: B

301. Sağ alına yumruk atılan bir boksörde en belirgin kontüzyon aşağıdakilerden hangisinde görülür?
- A) Sağ oksipital
  - B) Sol oksipital
  - C) Sağ frontal
  - D) Sol frontal
  - E) Sağ paryetal

Doğru cevap: C

## 77. NÖROKUTANÖZ SENDROLAR

- Multipl nörofibromların ve gözde Lisch nodülünün görüldüğü fakomatoz hangisidir... Nörofibromatozis tip 1
- Sekizinci kafa çiftinde bilateral schwannoma hangi nörokutanöz sendromda görülür... Nörofibromatozis tip 2
- Multipl menenjiyomların izlendiği fakomatoz hangisidir... Nörofibromatozis tip 2
- Deride adenoma sebaseum, renal anjiyomiyolipomun ve kardiyak rabdomiyomun izlendiği nörokutanöz sendrom hangisidir... Tuberoskleroz
- Tuberosklerozda görülen beyin tümörü... subependimal dev hücreli astrositom
- Tuberosklerozda hangi gende mutasyon görülür... TSC1 ve TSC2
- Retinal anjiyomlara ek olarak, feokromasitoma, renal hücreli karsinom ve serebellar hemangioblastomun olduğu fakomatoz hangisidir... Von Hippel Lindau
- Beşinci kafa çifti trasesinde kutanöz anjiyomlarla beraber serebral kalsifikasyon hangi fakomatozda görülür... Sturge Weber hastalığı

#### SORULAR

302. Aşağıdakilerden hangisi nörokutanöz sendromlar arasında yer almaz?
- A) Nörofibromatozis tip 1
  - B) Von Hippel-Lindau sendromu
  - C) Sturge-Weber sendromu
  - D) Dandy-Walker malformasyonu
  - E) Tuberoskleroz

Doğru cevap: D

## İLGİLİ NOTLAR

Tüm seçenekleri bir çırpıda nasıl da eliyoruz değil mi? Epidural hematom travmatik kanama türüdür.